



SYDENHAM

1693










50486/A/1









Thomas Jacob

Thomas Jacob

Thomas Jacob

Thomas Jacob

Thomas Jacob

Thomas Jacob

Sum

Thomas Jacob

Thomas Jacob

Tractatus, (cui Titulus, *Processus  
Integri in Morbis ferè omnibus  
curandis*) à Clarissimo D. D.  
Thomâ Sydenham Conscriptus  
Imprimatur.

*Thomas Burwell*, Præses.

*Humphrey Brook,*  
*Jos. Clerk,*  
*Guilielmus Briggs,*  
*Fr. Slare,* } Censores.

Datum 18<sup>o</sup>. Die *Augusti*  
A. D. 1693. in Comi-  
tiis Censoriis ex Ædi-  
bus Collegii nostri.

*Tho. Basset*, Warden.



77257  
Processus Integri

Ed.

IN

MORBIS

Ferè omnibus

CURANDIS,

A.D°. *Thoma Sydenham*, M.D.

Conscripti.

Quibus accessit gra-  
phica Symptoma-  
tum delineatio.

---

L O N D I N I :

Impensis *Sam. Smith*, & *Benj. Walford*,  
ad Insignia Principis, & *Ja. Knap-*  
*ton*, ad Insigne Coronæ in Coemete-  
rio D. Pauli. 1693.





---

---

## *Amice Lector.*

**S**pecimen habes Praxeos eximiae, in dilectissimi filii M. D. usum, cautè & diligenter excogitatum, suâ ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritate ista quâ omnes excepit, concessum a *Cl. Sydenham*, Viro sanè cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modo in arte sua mirâ sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo; sed & probis moribus, & in humanum genus, studio & amore insignibus adeo, ut apud omnes summum sui reliquerit desiderium: Cujus præcepta licèt animo meo & imo pectore infixæ sint, ne tamen forè fortunâ in mei ipsius & ægrorum detrimentum excidant memoriâ parùm fidâ typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoque intervirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter *Miscellanea Curiosa* superioris anni Norimbergæ editam; sed ineptâ mole inutile. Prodit tandem eo modo vestitum ut tibi sit in quovis loco paratum; fragmentis cerebri vanis

& futilibus sciolorum dogmatis nequaquam  
refertum, nec hypothefi placidâ solidis ut vi-  
detur rationum momentis undequaque con-  
ftipatâ superbiens; humile autem & mode-  
ftum accuratè morbos depingit, & accura-  
tiùs adhuc medetur; in id solum follicitum  
ut innotefcat quod natura faciat aut ferat.  
Et fi verum loqui liceat, modo partium fir-  
tus noveris, pateant tibi per Symptomata  
ægritudines, (quod affiduâ edifcas observa-  
tione) fcias deinde veram & genuinam me-  
dendi methodum per diætam & Pharmaci-  
am adhibere, feliciffimus eris practicus,  
& tibi & infirmis optimè confules. Parùm  
interim tuâ refert utrum Alkali peccet an  
Acidum, num in Spiritibus Animalibus, an  
in ipfo fanguine, aut in recondito aliquo  
Viscere delitefcant morbi minera; unde de  
Periodico Intermittentium reditu doctè fatis  
& prolixè poffis differere; dum interea ipfa  
Febris fine ullis ambagibus, inquietudine,  
fiti, calore, pulſu celeri, naufcâ, cæterisque  
Symptomatis, etiam aſtantibus palam eſt,  
& aperrè dignoſcitur: Hinc ſæpius mirari  
ſubit, quamobrem anxie ita & ſcrupuloſè  
immediatas & proximas morborum cauſas,  
dum Medicinam pertractandam ſuſcipiunt,  
indagare ſatagunt, & è tenebris iſtis, qui-  
bus natura obduxit, irritò licèt conatu, eru-  
ere, gravi & ſubactò iudicio viri, & in praxi  
verſatiſſimi; ſatis interim gnari ſe latere vel  
quævis

quævis obvia; unde enim dimanat gramini viridis, aut albus nivis color? Quid est quod humana anima ratiocinari nequeat dum adhuc Infantes aut Pueri sumus? Unde forma tua Specifica? Satiùs esset Medicum quam Philosophum agere, (quis enim unquam Cartesium sibi Medicum voluerit). minutissima Phænomena planè & ritè enumerare, & remedia quibus unusquisque morbus faciliùs cedat, candido & sincero animo proponere; ita tandem limites suos prætergressa, quibus angustis nimis jam includitur; ars nobilissima, omnibus, quaquaversum patet orbis, sæliciter satis & prosperè salutem, filiis autem suis honores summos conciliabit.

Quid in Febris, Variolis, Morbillis, acutis cæteris, ut & Chronicis sanandis valuit optimè meritis autor noster, sequentes indicant paginæ. Regimen & Dieta instituntur aptissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria; nec in Pharmacopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse sitim suam restinguere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim & pro libitu hauriendam, unde miè reficiuntur & refrigerantur, concedit; nec immanitate plus quam barbarâ, precibus eorum sardus, Apozemata & Julapia præ ingrato sapore fastidita constituit; maximam adhibet cautelam ne exæstuans nimis, vel igne luculentiori, vel stragulo



gulorum onere, plus adhuc incalesceret, vel à propinatis forsàn remediis eum in finem ut per poros eliminetur materia morbifica cruda adhuc & inconcocta, quæ tamen hâc datâ ansâ concitato motu cerebrum petit, unde Phrenesis aut Coma, aut extravasato sanguine deturpant cutim maculæ purpureæ, aut eruptiones quas vocant miliares collum & pectus ubivis obsident. Nunquid ad amissum magis depingi poterat quam Variolarum historia? eruptionis diem in utraque specie designat, pustularum ingenium ad unguem describit, quo tempore incipiat, & quamdiu continetur Salivatio, quo iterum faciei manuumque tumor se prodatur, quid tandem quolibet die expectandum disertè explicat. Paregoricorum usum, quo emolumento judicent Practici, primus persuasit, malum, ingerendi Cardiaca ante eruptionem, morem, unde sæpe accersitum fuerit confluentium genus, meritò primus improbavit. Melius autem hæc ex ipso fonte. Valeas itaque amice Lector, & sicubi scateant Mendocæ ignoscas.

S. M.



---

---

O Rhe diuiso, vacuâque vix dum  
Urbe decessit furibunda Pests;  
Strage non nostrâ satiata, verum  
Strata ruinâ :

Fæta quin Lethi variante larvâ  
Febris exarsit, face nunc citatâ  
Torret exundans, itidemque lentâ  
Tecta favillâ.

Virginum castos temerasse vulcus  
Hanc juvat, putri scelerata tabo  
Polluit viras ; tenet una formas  
Mille nocendi.

Horruit Diram Medicina Phœbo  
Quæsta : qui tandem, cape mutatas,  
Torqueat velox mea Sydenhamus  
Tela, sagittas.

Febris irato tremefacta lætas  
Deserit Terras, fugit ecce Dextram  
Osa vitalem ! Stygiâque frendet  
Mersa Palude.

Fata,

*Fata, sed nullâ fugienda sorte,  
Invident etsi tibi Sydenhamum :  
Posthumus floret, rediviva lætis  
En levat ora.*

*Mente, non Lethe violandus ipsâ,  
Vivit in grata, pia vel sub Umbris  
Cura vicum nunc tua præbet, in te  
Ipse revixit.*

*Amico Integerrimo, Medico Exper-  
tissimo S. M. ob iteratam hujus ex-  
imix Praxeos Editionem, gratula-  
bundus hæc vovet,*

*Christophorus Crelle, M.D.*

---

Index

# Index Rerum.

## A.

**D**E Abortu Præcavendo 58  
Ambustis 85  
Angina 26  
Apoplexia 40  
Asthmate 90

## C.

**C**Anis rabidi morsu 89  
Chlorosi 81  
Cholera Morbo 50  
Chorea Sancti Viti 38  
Colica biliosa 48  
Colica hysterica 55  
Colica Pictorum 52  
Contusionibus 87

## D.

**D**iabete 72  
Diarrhoea 45  
Dysenteria *Ibid.*

## E.

**E**Pilepsia puerorum 75

## F.

**F**ebre Stationaria 15  
Febre Constitutum variarum 13  
Febribus à Dentitione ortis 78  
Febre depuratoria 10  
Febre Erysipelatosa 23  
Febre Infantum 17  
Febre Hætica Infantum 79  
Febre Intermittenti 13  
Febre Pestilentiali 11  
Febre Scarlatina 17  
Fluore albo 71  
Furture five porrigine capitis 88

## G.

**G**Onorrhoea viru-  
lenta 65  
H.

# I N D E X.

H.

<b>H</b> æmoptoe	83
Hæmorrhagia na- rium	79
Hæmorrhoidum dolore	73
Hæmorrhoidum fluxu immodico	74
Hydrope	60
pochondriaca affe- ctiōne	5
Hysterica passiōe. <i>ibid.</i>	

I.

<b>I</b> ctero	57
Iliaca passiōe	52

L.

<b>L</b> ochlorum fluxu im- modico.	58
Lochlorum suppressio- ne	59
Lue Venerea	68

M.

<b>M</b> ania communi.	86
Mensium fluxu immodico	53
Mensium suppressiōe	82
Morbillis	27

N.

<b>N</b> ephritico Parox- ysmo	44
-----------------------------------	----

O.

<b>O</b> phthalmia	43
--------------------	----

P.

<b>P</b> aralyfi	91
Peripneumonia no- tha	20
Phthysi	92
Pleuritide	18
Pruritu ferino	25
Punctura tendinis	85

R.

<b>R</b> achitide vera	76
Rheumatismo	21
Remediorum formulæ	I

S.

<b>S</b> corbuto	95
------------------	----

T.

<b>T</b> enesmo	45
Tussi	92

V.

<b>V</b> aricollis	30
Ulcere Vesicæ	89
Vomitu Sanguinis	83
Uteri procidentia	44

*Medica-*



*Medicamentorum quædam formula in praxi magis familiares.*

*Potio Communis Purgativa.*

℞ **T** *Amarind. ʒß, fol. Sennæ ʒij, Rhei. ʒiß, coq. f. q. aq. ad ʒiiij, in Colatura dissolve Mannæ & Syrup. Rosar. solut. an. ʒj, m. f. Potio.*

*Emeticum Commune.*

℞ *Aq. Cardui Benedict. ʒij, Infus. Croc. Metall. ʒj, Syr. Caryophyll. ʒß, m. f. vomitorium. Sumat horâ 4<sup>a</sup>. Pomeridianâ, superbibendo post singulas vomitiones haustum largum liquoris possetrici.*

*Julapium Perlatum.*

℞ *Aq. Cerasor. nigr. lact. Alexeter. aa. ʒiiij, aq. Cinnamom. hordeat. ʒj, Margarit. præparat. ʒiß, sacchar. Crystall. q. s. adde aq. Rosar.*  
B
Da

*Damascen, ʒß, f. Julap. de quo cap. cochlear.  
ʒv. vel v, in Languoribus.*

### Julapium Cardiacum.

*℞ Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ʒiij,  
aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri,  
an. ʒß, m. f. Julap. de quo capiat sæpius.*

### Decoctum Diæticum.

*℞ Rad. Sarsaparill. ʒvj, lign. Sassafr. &  
Chinæ an. ʒij, Glycyrrhiz. ʒj, coq. in aq. font.  
Congis ij, per horæ dimidium; deinde stent  
clausè super cineres calidos per horas xij, postea  
ebulliant ad tertiæ partis consumptionem; Cum  
primum ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi  
ʒß, post duas horas coletur, & postea depuretur  
per residentiam, & liquor reponatur lagenis vi-  
treis probè clausis ad usum. Sit pro potu or-  
dinario per xxx, dies.*

### Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.

*℞ Rad. gramin. Cichor. Fenicul. & Aspa-  
rag. an. ʒj, uvarum Corinthiac. & passul. enu-  
cleat. an. ʒij, fol. hepat. ling. cerv. & cap.  
Ven. an. M. j, fol. Beccabung. sub finem addit.  
M. ij, coq. s. q. aq. fontan. ad ʒij, sub finem  
adde vini Rhenani ʒß. Colaturâ adhuc ca-  
lente, infunde ad duas horas, vase clauso, Cochl.  
hortens.*

*hortens. M. j, colatur. adde syr. è quinq; radic. & è succo Aurant. an. ʒij, aq. Cinnamom. hordeat. ʒj, M. f. Apozema. Sumat tʒß, manè & 5<sup>a</sup> pomeridianâ per xiv, dies.*

### *Eclegma Incrassans in Tussi.*

*R. Ol. Amygd. dulc. ʒj, Syr. Papav. R̄æad. Portulac. Fʒub. & Loboc sani, an. ʒß, Sacchar. crystall. q. s. M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatium, & f. Linctus perfectè mistus; recondatur in olla figulina, ad usum. Cap. sæpius lambend. è baculo Liquiritiæ.*

### *Eclegma fortiùs incrassans.*

*R. Conserv. Ros. rub. Syr. violar. & de Mecon. an. ʒj, sem. papav. alb. ʒiij, contundantur simul & per setaceum trajiciantur, deindè adde ol. nuc. moschat. express. gr. vj, f. Eclegma.*

### *In Defluxione tenui.*

*R. Conserv. rosar. rub. ʒij, Syr. de Mecon. & jʒub. an. ʒj, Oliban. Mastich. & Succin. an. ʒj, ol. nuc. Moschat. per expressionem gr. vj, M. f. Loboch. de quo lambat sæpè; bis in die cap. eclegm. descript. cochl. j, intilland. Balsam. Sulphur. Anisat. à gut. viij, ad gut. xij.*



## Cerevisia Purgativa.

℞ Polypod. Querc. ℥j, Rad. Rhabarb. Monach. fol. sennæ & passul. enucleat. an. ℥ss, Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. an. ℥iij, fol. Cochl. hortens. salu. an. M. iv. Aurantior. incis. N° iv, infunde in Congiis v, vel vj, Cerevisiæ non lupulatae fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies xiv, vel xxj, præcipuè verò sumat haustum singulis Auroris.

## Emplastrum Hystericum.

℞ Galbani in tinctura Castor. solut. & coctat. ℥iij, Tacamabac. ℥ij, f. Emplast. proumbilico.

## Catharticum pro Infantibus tenellis.

℞ Syrup. Cichor. cum Rhabarb. Cochl. j, parvulum.

## Decoctum Amarum Purgativum.

℞ Decoct. amar. duplicatâ senâ ℥iv, Syrup. de Spina Cervina ℥j. Elect. de Succ. Rosar. ℥ij, M. f. Potio.

*De affectione, in foeminis, hysterica; moribus, hypochondriacâ dicta.*

**C**UM à casu aliquo graviore molestum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; urina subinde limpidissima copiosè excernitur; sanitatis recuperandæ spes omnis protinus abjicitur, & tristissima quævis sibi ominatur ægrotæ; quamcunque corporis partem morbus infederit (plurimas autem insidet) symptomata ei parti competentia confestim urgent; in capite apoplexia, hemiplegiâ soluta, statim à partu adoritur; spasmi epilepsiæ per similes (vulgò uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versùs intumescunt) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice polsis contegere, ægrâ interim materiam viridem bili porraceâ parem evomente, miserè excruciat; cordis palpitationem, tussim, passionem iliacam & colicam, nephritin, urinæ suppressionem æmulator pa-

roxyſinus ; vomitiones enormes, diarrhœam ſubinde excitat ; externè in carne muſculofa nunc dolorem nunc tumorem inducit, in tibiis hydropis inſtar ; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes ; dolor doſſi creberrimè ſævit ; & ſæpe ſæpius adeò refrigerantur externæ partes, ut cadaver planè referant ; in riſum & lachrymas effuſiſſimas ſine ulla *μεγάλαι* ridiculè erumpunt ; ptyaliſmus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio delibutas facilè crederes. Dolores hyſterici, quacunq; partem obſident ; ubi diſceſſerint, teneritudinem, quæ tangi recuſat, relinquunt, ac ſi verberatæ fuiſſent carnes.

Mittatur Sanguis ad *ζviij*.

*Emplaſt. de Galbano* umbilico admoveatur. Sequenti manè aggrediatur uſum ſequentium pilularum ;

*Rx Pil. Coch. maj. ʒij, Caſtor. pulv. gr. ij, Baſam. Peruv. gutt. iij, f. Pil. xij, Cap. iv.* ſingulis vel alternis matutinis, pro ratione virium, horâ 4<sup>a</sup> vel 5<sup>a</sup> matutinâ, ſuperdormiendo.

*Rx Aq. Rutæ ʒiv, Bryon. comp. ʒij, Caſtor. nodulo ligat. & in vitro ſuſpenſ. ʒβ, Sacchar. Cryſtall. q. ſ. de quo capiat cochl. iv, vel v,* in omni languore. Poſt has pilulas ſumptas utatur ſequentibus ;

*Rx*



℞ *Limatur. Chalyb. gr. viij, cum s. q. Extract. Absinth. f. Pil. N° iij.* Sumat summo manè, & repetantur horâ 5<sup>a</sup> pomeridianâ per xxx dies, superbibendo haustum Vini Absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat.

℞ *Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. flaved. Aurant. an. ʒj, Angelic. condit. Nuc. Moschat. condit. & Theriac. Andromach. an. ʒss, pulv. Ari comp. ʒiij, Zinzib. condit. ʒij, cum s. q. Syrup. de succ. citr. vel, ejus defectu, Syr. Aurantior. f. Electuarium.*

℞ *Elect. præscript. ʒij, limatur. Chalyb. gr. viij, cum s. q. Syrup. Aurantior. f. Bolus* sumendus manè & serò, superbibendo haustum vini absinthitis, vel Cochl. vj seq. Infusionis.

℞ *Rad. Angelic. Enul. campan. & Imperator. an. ʒj, fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. & Chamædr. an. M. j, Cort. Aurant. duor. incis. affunde vini Hispanic. q. s. ad supereminentiam duorum digitorum. Coletur tempore usus. Vel,*

In Delicatulis Chalybs exhiberi poterit in forma pulv. sequentis ;

℞ *Limatur. Chalyb. probè trit, ʒj, pulv. Ari comp. ʒvj, sem. Coriand. præparat. Anisi, Fenicul. dulc. an. ʒss, Cinnamom. acutiss. Corall. rubr. præparat. an. ʒiij, Nuc. Moschat. ʒij, f. omnium pulvis subtilissimus, cui adde sacchar. albiss. ad pondus omnium, hujus cap. Cochleari ʒss, bis in die per 4 dies, tum ʒj, bis in die per 40 dies, superbibend. Cochl. ʒj, seq. Julap. vel Vini Absinthitis.*

℞ *Aq. Lact. Alexeter. ʒxij, Gentian. comp. ʒiv, Absinth. magis comp. ʒij, sacchar. albiss. q. s. f. Julap. Vel;*

℞ *Vini Rhenan. Absinth. ʒss, aq. Gentian. comp. ʒij. Syr. Caryophyll. ʒj, f. Julap.*

℞ *Myrrh. elect. Galban. & Asæ fætida, an. ʒj, Castor. ʒss, cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pil. è singulis drachmis xij. Sumat iij, singulis noctibus, superbibend. aq. Bryon. compos. Cochl. iij, vel iv, per totum decursum hujus processûs.*

*Si Pilulæ Præscriptæ ventrem moverint, utatur sequentibus;*

℞ *Castor. ʒj, sal. succin. volatil. ʒss, cum s. q. extract. Rutæ, f. pilulæ N° xxiv, Cap. iij, singulis noctibus, superbibendo Julapii hysteric. Cochl. iij, vel iv.*

*Sp.*

Sp. C. C. ad gutt. xvj, vel xvij, in aqua aliqua appropriata sæpius exhibitus valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas ;

℞ Trochisc. de Myrrh. pulv. ʒj, Balsam. sulphur. Terebinth. gut. iv, cum s. q. gumm. Ammoniac. solut. f. Pil. N<sup>o</sup> iv. Cap. manè & serò superbib. Julap. hysteric. Cochl. iv, vel v, instillando Sp. C. C. gutt. xij.

*Electuarium Antiscorbutic.* cum aqua ibidem descripta prodest in his affectionibus, ut & *Electuar.* corroborans cum additione *Conserv.* Cochl. hortens. ʒj, pulv. Ari Compos. ʒvj, superbibendo præscriptam aquam.

At si affectus his non cedat remediis, eundem est ad *aquas ferreas* ; & si neq; his, tum ad *Sulphureas*, quales sunt *Bathonienses*.

Inter bibendum *aquas ferreas* hæc observanda ; si aliquod Symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis æger abstineat, donec Symptoma istud penitus evanuerit. Æger in earum usu per sex septimanas ad minimum, vel potius ad duos menses perseveret. *Zinziber conditum*, vel *Semina Carui Saccharata*, ad calefaciendum ventriculum subinde sumat. *Pilule* etiam *hystericæ iij*, devorari possunt per primas x, noctes, superbibendo *Julap. hysteric.* Cochl. iv, vel v.



Quoad usum aquarum Bathoniensium, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur, atq; ita alternatim per sex septimanas vel duos menses.

Si *Chalybs* justo plus corpus calefaciat, tum per ejus usum, 4<sup>a</sup> quâq; Aurorâ sumat *aq. mineralium purgantium* ℥iv. Quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut solent Cathartica ex officinis deprompta.

*De Febre Depuratoria annorum 1661, 62, 63, 64.*

Si æger juvenis sit, extrahatur sanguis è brachio, & eodem die post aliquot horas, vel sequenti die duabus horis post leve prandium, *Emeticum ex infus. Croc. Metall.* exhibeatur; & post finitam operationem Emetici, hoc vel simile paregoricum.

℞ *Aq. Cerasor. nigr.* ℥ss, *aq. Epidem.* ℥ß, *Laudan. Liquid.* gutt. xvj, *Syr. Caryophyll.* ℥ij, *M. f. Haustw.*

Post hunc diem usq; ad undecimum vel duodecimum singulis Auroris injiciatur enemmas sequens;

℞ *Decoct. commun. pro Clystere* ℥j. (vel *lactis vaccini eandem quantitatem*) *Sacchar. Culinar.* & *Syrup. violac. an.* ℥ij, *f. Enema.*

Post

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quò materia febrilis citius concoquatur, ad quem etiam finem Cardiaca moderata his ultimis diebus exhibita apprimè conducunt ; ut,

℞ Pulv. è Chel. Cancror. comp. gr. xiv, Elect. de Ovo ʒß, cum s. q. Syr. Caryophyll. f. Bolus sumendus octavâ quâq; horâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. v, vel vj.

℞ Aq. lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ʒiij, Aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. an. ʒj, M. f. Julap. vel alia his similia.

Hac methodo sollicitè observatâ, usitatò circa xv diem (tum ex laudabili in urina separatione, tum ex manifesta Symptomatum omnium remissione) tempestivum esse Portionem Purgantem communem exhibere percipies.

*De Febre Pestilentiali 1665, 66.*

Post venæ sectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia Lanea sincipiti alligetur ; tum, si vomitus non adsit, hoc vel simile Hydroticum exhibe.

℞ Theriac. Andromach. ʒß, Elect. de ov. ʒj, pulv. è chel. Cancr. comp. gr. xij, Coccinel. gr. viij, Croc. gr. iv, cum s. q. Succ. kermes, f. Bolus,

*Bolus*, quem sumat sextâ quâq; horâ, superbibendo *Cochl. vj*, seq. *Julapii*.

*Rx Aq. Card. Benedict. & Scord. compos. an. ziv, aq. Theriacal. stillatit. zij, Syr. Caryophyll. zj, M. f. Julapium.*

Si adsit vomitio, hydroticum differatur, donec solo tegumentorum pondere sudor promanare incipiat, linteaminis parte vultui superinductâ.

Incepta Diaphoresis haustulis *Zythogalæ salviâ alteratæ*, vel *Cerevisiæ* cui macis aliquantulum incoxeris subinde repetitis ad naturalis diei spacium (i. e. horas 24.) est continuanda; in sudore licet jusculis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sustinui; per horas adhuc à finito sudore *xxiv*, ægro se in lecto continente frigus cautè deviteretur. Indusium sponte suâ in corpore arefcere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & *Zythogalæ salviâ alteratæ* usus etiamnum continuetur, in seq. luce potio purgat. communis exhibeatur.

Anni 1667, 1668, Febrim Variolosam & Variolas produxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72, Febrim Dysentericam.

Anni 1673, 74, 75, Febrim Comatosam.



Curationem febrium horum annorum non attingo; quoniam methodo in febre anni 1685, &c. descriptâ curari eas potuisse autumo.

*De febris intermittentibus.*

Cum rigore & horrore adoritur paroxysmus, quibus mox succedit calor, & huic tandem sudor, & subsequens *απυρεξία*: licet in primis morbi diebus, Autumnomaximè, aliquoties remissio potius quàm intermissio perlentiscitur, in calore æq; ac in rigore vomiturit ut plurimum ac vehementer ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultis crurum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, rauco, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciant.

*R Cort. Peruv. subtiliss. pulv. ʒj, cum s. q. Syr. Caryophyll. vel de Resis siccis, f. Electuarium dividendum in xij, doses; quarum unam capiat 4<sup>a</sup> quâq; horâ, superbibendo Vini cujuslibet haustum, incipiend. immediatè post paroxysmum.*

Si autem præscripti boli ventrem moveant, in haustu Vini dentur gutt. x, *Laudan. Liquid.* singulis vel alternis vicibus post assumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipuè in Quartana) repetatur processus prædictus singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat,

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒj, cum f. q. Syr. Caryophyll. f. Pilule mediocris magnitudinis, quarum capiat ʒj, quartâ quâq; horâ.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒij, Vin. Rhenan. ℥ij, stent simul in Infusione frigida, & coletur per manicam Hippocratis. Usus tempore cap. ʒiij, terriâ vel 4<sup>a</sup> quâq; horâ.

#### Altera Methodus curandi Tertianas.

℞ Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverisat. gr. xv, Vin. alb. ʒiij. Sumat duabus horis ante Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per iij, vel iv, horas, idem faciendo per duas alias vices ante Paroxysmum.

Pro Infantibus febre intermittente laborantibus.

℞ Aq. cerasor. nigr. & Vini Rhenan. an. ʒij, Cort. Peruv. subtiliss. pulv. ʒiij, Syr. Caryophyll. ʒj, M. f. Fulap. Cap. Cochl. j, alterumve, pro ratione ætatis, 4<sup>a</sup> quâq; horâ, donec Paroxysmi non amplius discrucient instillando alternis vicibus, si Diarrhœa adfuerit; Laud. Liquid. gutt. j, vel ij.

Da

*De febre Stationaria, ab an. 1685 ad 90.*

Calor & frigus se invicem excipiunt, artus pariter & caput dolent, pulsus interim ferè sanus, nonnunquam tussis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio febris prope noctem, inquietudo, fitis, lingua vel humida & ex omni parte pelliculâ albâ & scabrâ vestita, vel sicca, fusci coloris in medio, quam partem undiq; cingit fimbria inalbescent. A jugi in lecto decubitu coma & phrenesis, à calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulsus inordinatus, tendinum subfultus, atq; ita tandem mors. Sudores in initio symptomatatici divexant, qui, si ab arte provocentur, viscosi à capite erumpunt, & materiam morbificam in caput aut in artus transferunt.

Mittat. Sanguis ad 3x, è brachio. Reiteretur Venæsectio; si modò respirationis difficultas, dolor capitis inter tussendum lancinans, & alia signa Peripneumoniæ nothæ adsint. In hoc casu tam venæsectio quàm Catharsis repetenda, donec æger convalescat.

Vesperi applicetur Epispasticum, & sequenti Aurorâ Potio Lenitiva præscribatur, quæ ad tertiam vicem alternis diebus reperatur, & horâ somni post Catharân haustus pacificus propinetur.



℞ *Aq. Paralys.* ℥iij, *Syr. de Mecon.* ℥j,  
*Succ. Limon. recent. extract.* *Cochl. ij*, *M. f.*  
*Haustum.*

Aphthæ & singultus spontesuâ post curationem febris supervenientes sponte evanescunt; Si in longum tempus decurrant, facillè fugantur *Cortic. Peruv.* ℥j, cum *Syr. Papav. Rhæad.* q. s. in formam *Electuar. vel pilular.* redactâ, superbibend. haustum lactis deflorati. Remedium hoc certissimè scopum attinget, si non frustrentur ejus vires ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis sequentia præscribantur.

℞ *Conserv. Lujul.* ℥ Cynosbat, an. ℥j, *conserv. Berber.* ℥ß, *Crem. Tart.* ℥j, cum s. q. *Syr. de Limonib. f. Electuarium*, de quo cap. ad magnitud. *Nuc. Moschat.* ter in die, superbibendo sequent. *Julap. Cochl. vj.*

℞ *Aq. Portulac. Lactuc. Paralys.* an. ℥iij, *Syr. de Limonib.* ℥jß, *Syr. Violar.* ℥j, *M. f. Zulapium.*

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger potionem retinere nequeat, *Pil. Coch. maj.* ad ℥ij, exhibeantur, tum etiam hypnoticum est concedendum, v, gr, *Laudan. Londin. gr.* jß, cum simili quantitate *Masticb. vel Laudan. Liquid. gutt. xvij*, in *aq. Cinnamon. herdeat.* ℥j.

*Decoctum album* sit pro potu, ut & *Cerevisia tenuis* pro libitu.

*De Infantibus febre Stationaria laborantibus.*

*Hirudines due* utrinq; ponè aures applicentur, dein *Emplastr. Epispasticum* cervici admoveatur.

*Cerevisiâ, quâ Rhabarbarum fuerit infusum, purgetur.*

Si post Catharsin febris intermittere videatur, tum *Julapium cum Cortice Peruviano* (in Capite de febre intermittent : pro infantibus descriptum) exhibeatur.

*De febre Scarlatina.*

Æstate exeunte, infantes præcipuè infestant. Rigent & horrent sub initium ; nec tamen admodum ægrotant ; cutis universa maculis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus & magis rubentibus quàm in morbillis, interstinguitur : Ad duos tresve dies persistunt, quo quidem tempore evanescent, & decedente subjectâ cuticulâ, squammulis fursuraceis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.

℞ *C. C. usti*, & pulv. è *Chel. cancr. comp.* an. ʒss, *Coccinel. gr. ij*, *Sacchar. Crystal. ʒj*, *M.f. pulvis subtiliss. in xij*, *Chartulas dividend. quarum unam Cap. 6<sup>a</sup> quâq; horâ, superbibendo cochl. ij, vel iij, sequentis Julapii.*

℞

*Rx Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexeter. an. .  
 ʒiij, Syr. è succ. citri ʒj, M. f. Fulap.*

Applicetur etiam Epispasticum cervici, & qualibet nocte *paregoricum ex Syr. de Mecon.* propinetur, & postquam symptomata cessaverint, purgetur æger.

### *De pleuritide.*

Inter Ver & Æstatem dominatur. A rigore & horrore orditur, quos statim comitantur calor, sitis, inquietudo & cætera februm symptomata; elapsis pauculis horis, æger vehementi dolore punctorio in laterum alterutro circa costas corripitur, qui nunc versus omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pectoris sese propagat, tussi crebrâ excruciat. Materia sputo rejecta in initio morbi pauca est & tenuis, & sæpe sanguinis particulis intermixta, progressu verò copiosior, & magis concocta, sanguine etiam permixto. Febris pari passu incedit cum tussi, sputo sanguinis, dolore, & pro ratione liberioris expectorationis sensim imminuitur; nunc alvus est astricta, nunc soluta nimis. Eductus è vena sanguis sevi liquati speciem præ se fert ubi refrixerit.

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti ad ʒx.



℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥iv, Sal. Prunel. 3j,  
Syr. Violar. 3j. M. f. Haustus, sumendus sta-  
tim à prima venæ sectione.

℞ Amygd. dulc. excorticat. N<sup>o</sup> v, sem. Me-  
lon. Pepon. an. 3ß, sem. Papav. alb. 3iij, aq.  
bord. 1ß, aq. Rosar. 3ij, cum s. q. sacchar.  
cand. f. s. a. Emulsio, Cap. 3iv, 4<sup>a</sup> quâq; ho-  
râ.

℞ Decoct. Pectoral. 1ßj, Syr. Violar. 3  
Cap. Ven. an. 3iß, M. f. Apozema. Cap. 1ßß,  
ter in die.

℞ Ol. Amygd. dulc. 3ij, Syr. Violar. 3  
Cap. Ven. an. 3j, Sacchar. Cand. q. s. M. f.  
Eclegma, de quo sæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc. per se, vel Oleum Sem.  
Lini recenter extract, exhiberi potest.

℞ Ol. Amygd. dulc. Lilior. 3 unguent. Di-  
altheæ, an. 3j, M. f. Linimentum, quo inun-  
gatur latus affectum manè & serò, superim-  
ponendo fol. Brassicæ.

Repetatur Venæsectio ad tres alias vices,  
ad eandem quantitatem, quatuor diebus  
continuis, ubi dolor & respirandi difficultas  
suadent.

*De peripneumonia notha.*

Ingruente hyeme & sæpe sub ejus exitum, emergit, insultu primo nunc incalescit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculiq; tussit, & inter tussendum dolor capitis lancinans premit, potulenta vomitu rejicit, urina turbida est & intensè rubet, sanguis pleuriticorum æmulus, anhelus crebrò & celeriter spiritum ducit, dolente thorace. Ab asthma sicco planè distinguitur, quòd in isto nunquam comparent febris indicia, in hac manifestò se produnt, licèt minora longè & magis obscura quàm in peripneumonia vera.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 3x, Die sequenti æger hanc potionem sumat.

*R Cassiæ extract. 3j, Glycy. 3ij, ficus pingues N° iv, fol. senn. 3ijss, Agaric. trochiscat. 3j, coq. s. q. aquæ ad 3iv, in Colatur. dissolv. Mannæ 3j, Syr. Rosar. solut. 3ss.*

Si verò potionem assumere nequeat, Cap. Pil. coch. maj. 3ij, horâ quariâ matutinâ.

Sequenti die celebretur iterum venæsectio, ad eandem quantitatem; ac postero die repetatur Catharsis, quæ porrò reperenda est alter nis diebus, vel post majora intervalla, pro ratione virium; Atq; insuper si Symptomata non cessaverint, extrahatur iterum sanguis semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot inter-

interjectis, prout res postulaverit ; sed ut plurimum venæsectio bis celebrata sufficiet. Interim, dum hæc fiunt, præsertim in diebus à purgatione vacuis, utatur *decocto Pectorali*, *Eclegmate* & *oleo Amygd. dulcium*, in *Pleuritide* descriptis.

*De Rheumatismo.*

Rigorem & horrorem & cætera febrium symptomata patiuntur, elapso die uno alterove (est & ubi citius) dolor adest atrox nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris & genibus præsertim, vicissim hos relinquens & illos occupans, rubore & tumore in parte, quam postremum affecit, adhuc residuis. Febris sensim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immanis sæviante. In lumbagine rheumatica immanis dolor adest, circa lumborum regionem fixus, nephritin mentiens, nisi quod æger non vomituriat, qui procumbere nequit, sed vel è lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetuâ agitatione nunc versùs anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur Sanguis è brachio lateris affecti, ad 3x.

Rx *Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. an. ʒiv.*  
*Syr. de Limonib. ʒjss, Syr. Violac. ʒj, M. f.*  
*Fulap. de quo bibat ad libitum.*

Præ-



Præscribend. *Emulsio 4. Sem. frigid. maj. Cataplasma è mica panis albiss. & lacte Croco tincto applicetur parti dolenti.*

Die sequenti eadem sanguinis quantitas detrahatur; atq; iterum, die uno vel altero interjecto, reiteretur, atq; porro quater vel pluries, si opus fuerit, hoc observando, ut post secundam Venæsectionem majora sint intervalla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis *Enema è lacte saccharato subinde injiciatur, vel sequens;*

*R Decoct. commun. pro Clystere ℥j, Syr. Violar. & Sacchar. culinar. an. ʒij, M. f. Enema.*

Si Imbecillitas ægri repetitionem Phlebotomiæ non ferat, tum post secundam vel tertiam venæsectionem *Curatio hac methodo tentanda.*

*Capiat alternis diebus potionem purgativam communem, donec convaluerit, & iisdem noctibus Pægoric. ex Syr. de Mecon.*

Sin his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualescunq; ferre nequeat, aggrediatur usum *Elect. & aq. Antiscorbutic.* in scorbuto descript. quæ etiam remedia locum habent in Rheumatismo Scorbutico.

In Juvenibus, atq; iis qui temperatè vixerunt, vino non plus æquo dediti, Rheumatismus

riſmus Diætâ ſimplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æq; fœliciter, ac repetitis Venæſectionibus (quas minus ferre queant) proſtigari poteſt. Ex. grat.

Solo Lactis ſero ad dies quatuor veſcatur æger, poſtea præter ſerum pane ſimilagineo ſemel in die loco prandii, donec penitus conualeſcat; niſi quod poſtremis diebus iterum panem in cœnam indulgere liceat. Symptomarum ceſſantibus, carnes pullorum elixorum, cæteraq; eupepta concedantur, tertio autem quoq; die ſolo lactis ſero victi-  
tet, donec tandem pancreaticè valeat.

*De febre eryſipelatoſa.*

Nulla non corporis pars, præſertim facies, tumet, dolet & ſummè rubet, puſtulæ denſæ, parvæ, in veſiculas ſubinde faceſſunt, quæ per frontem caputq; ſerpunt, oculi tumore obruti, rigor & horror atq; reliqua febris indicia adſunt. In alia hujus morbi ſpecie, liquorum attenuantium potationi ſuperveniente, febricula adeſt, puſtulæ urticarum puncturas referentes, nonnunquam in veſiculas ſublata, mox recedentes, tuberculorum more ſub cutē ſe condentes, maximè pruriunt, & ſcalpendo ruſum apparent. Eſt & alia eruptionis ſpecies, pectus ut plurimum obſidens, macula nimirum lata, cuti vix ſupereminens, porriginofa, cum ſquammulis flavis,  
qua



qua vigente, æger bene se habet, eâdem evanescente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iisdem remediis, quibus pruritus ferinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis è brachio ad  $\text{zix}$ , vel  $x$ , Die sequenti sumat *portionem communem purgativam*.

R Rad. *Althææ* & *Lilior. an.*  $\text{zj}$ , fol. *Malv. Sambuc. Verbasc. flor. Chamæmel. Melilot. summitat. Hyperic. & centaur. minor. an.*  $\text{Mj}$ , sem. *Lini, fœnugræc. an.*  $\text{zss}$ , coq. *f. q. aq. ad ℥iij*, Coletur liquor, & tempore usûs adde singulis libris decocti *Sp. Vini*  $\text{zij}$ . Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac expressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post fotum sequenti mixturâ illinatur.

R *Sp. Vini*  $\text{℥ss}$ , *Theriac. Androm.*  $\text{zij}$ , pulv. *piperis longi, & Caryophyll. an.*  $\text{zij}$ , *f. mixtura*, quâ *Charta Emporetica* madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ venæsectioni non cedat morbus, tum repetatur : & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæsectione liberis *Enema è lacte cum Syr. Violarum, Emulsio Refrigerans, & Zulap. refrigerans*, sunt præscribenda.

De



*De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharsi non cedunt.*

*R̄ Theriac. Andromach. ʒss, Elect. de ovo ʒj, rad. Serpentar. Virgin. subtiliss. pulver. gr. xv, Lapid. Bezoar. oriental. gr. v, cum s. q. Syr. è conditur. citri, f. Bolus, horâ somni sumendus per dies xxj, superbibendo cochl. vj, sequent. Julapii.*

*R̄ Aq. Card. Benedict. ʒvj, aq. Epidem. & Theriacal. Stillat. an. ʒij, Syrup. Caryophyll. ʒj, M. f. Julap.*

*Singulis matutinis cap. liquoris posseticî ʒss, calidè, & sudet horæ unius spatio.*

*His finitis, si Pustulæ adhuc non evanuerint, sequenti Linimento partes affectæ inungantur.*

*R̄ Unguent. ex Oxylapatho ʒij, Unguent. Pomati ʒj, flor. Sulphur. ʒiij, ol. Rhodii ʒss, f. Linimentum.*

*Veruntamen Medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi Venæsectione & Catharsi ritè præmissis.*

*De angina.*

Angina inter Ver & Æstatem ut plurimum aggredditur. Sequuntur febris insultum dolor & faucium inflammatio, unde à tumore uvulæ, tonsillarum & laryngis, nec deglutire queat Æger, nec spiritum ducere.

Mittatur Sanguis è Brachio copiosè. Tangantur partes inflammatae melle Rosaceo, Sp. Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem permixto, vel Sp. Vitrioli solo. Mox Gargarisina sequens usurpetur, non vulgari modo; sed ita ut sine ulla agitatione in ore contineatur, donec incalescat; dein expuatur, & repetatur subindè.

℞ Aq. Plantag. Ros. Rub. ℥ Sperm. Rannar. an. ℥iv, album. ovor. in aquam agitando redact. N° iij, Sacchar. Crystal. ℥iij, M. f. Gargarisma.

*Emulsio Refrigerans* in Pleuritide descripta indies sumatur.

Sequenti mandè, nisi febris & dolor inter deglutiendum remiserint, Venæsectio repetatur, Catharsi in diem posterum rejectâ, aliàs Catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quod oppidò rarum) repetatur adhuc Venæsectio, & Catharsis; Epispasticum amplum ac forte applicetur

plicetur cervici post primam Venæsectionem.

Omni mandè, nisi diebus purgationi datis Ene-  
ma refrigerans & Emolliens injiciatur; Diætâ  
tenui utatur æger, & lecto per horas ali-  
quot quotidie absistat.

In his omnibus Febribus, quas intercur-  
rentes appello, ut etiam in illa, quæ statio-  
naria est, cautè observandum, quòd æger à  
lecto abstineat magnam diei partem, ut jus-  
culis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis  
victitet, & cerevisiam tenuem Lupulatam &  
hydrogalam pro potu ordinario bibat.

#### *De Morbillis.*

Infantes plerumq; impetunt. Primo diè  
rigent horrèntque, calent & frigent alterna-  
tim. Secundo consummatam febrim accer-  
sunt. Ægritudo vehemens, sitis, inappeten-  
tia, lingua alba (non verò sicca) tussicula,  
capitis & oculorum gravedo, & somnolentia  
perpetua, acriter premunt, humor è naribus &  
oculis jugiter stillat (quæ lachrymæ certissi-  
mum morbillorum signum.) Huc accedunt  
sternutatio, tumor palpebrarum paulò ante  
eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum deje-  
ctionibus colore viridi in dentientibus præ-  
sertim. Symptomata ingravescunt ad quar-  
tum usq; diem, quo quidem die (nonnun-  
quam quinto) in fronte & facie maculæ par-



væ, rubræ, pulicum morsibus persimiles prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è parvulis papulis, supra cutim paululum elevatis constantur, quarum protuberantia digito levi, vix oculorum acie, deprehendi possit.

A facie, quam primò solùm occupant, ad pectus ventrèmq; crura deinde tibiásque propagantur maculæ; in his autem partibus latæ & rubræ, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus; sed tussicula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & innappetentia perseverant. Die sexto aut circiter frons & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptâq; cuticulâ, in reliquo corpore maculæ latissimæ sunt, & maximè rubescunt, Octavo circiter die in facie evanescunt, & vix in reliquo corpore permanent. Nono nullæ prorsus sunt; per faciem verò & artus, quandoq; & totum corpus in farinam quandam & squammulas facessunt. & tunc temporis febris, spirandi difficultas & tussicula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

℞ Decoct. Pectoral. ℥jss, Syrup. Violac. &  
Cap. Ven. an. ℥iſs, M. f. Apozema; Cap. ℥iij,  
vel iv. ter vel quater in die.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij, Syr. Violar. &  
Cap. Ven. an. ℥j, Sacchar. Cand. albiss. q. ſ.  
M. f. Eclegma, de quo sæpius lambat, præ-  
cipuè quando tussis urget.

℞ Aq. Cerasor. nigr. ℥iij, Syr. de Mecon.  
℥j, M. f. haustus singulis noctibus sumen-  
dus, à primo morbi insultu, usq; dum conva-  
luerit æger, dosin augendo vel imminuendo  
pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum  
post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris,  
respirandi difficultas, & alia Symptomata  
Peripneumoniam mentientia supervenerint,  
sanguis liberaliter extrahendus è brachio,  
semel, bis, vel ter, prout opus fuerit, con-  
venienti spatio interposito inter singulas  
Venæsectiones; Atq; etiam continuentur  
decoctum Pectorale supra descriptum, ut &  
Lobach, vel Ol. Amygd. dulc. per se. Circa  
diem xij, ab invasione Cathartico lenienti  
purgetur.

Diarrhœa, quæ morbillos excipit, Venæ-  
sectione sanatur.

*De Variolis.*

Distinctæ sunt vel confluentes, & in distinctis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomitio, in adultis ingens in sudores propensio (& hinc minimè confluxuras esse licet conjicere) dolor sub scrobiculo cordis si manu prematur, stupor & somnolentia, nonnunquam & insultus epileptici (in infantibus præsertim) quibus si, dentitione peractâ, corripiantur, in procinctu esse variolas possis prædicere, ita ut si fortè insultum epilepticum sub vesperam patiantur, sequenti Aurorâ in conspectum se daturæ sunt variolæ, mi-  
 res ut plurimum & rarissimè confluentes. Quarto inclusivè ab invasione die, nonnunquam seriùs, rarò tamen ante illum erumpunt, quo tempore vel minuuntur Symptomata vel prorsus evanescunt. In eruptione autem subrubræ primò pustulæ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes, sparsim se produnt per faciem, collum, pectus, & corpus universum; tunc in faucibus dolor, qui cum pustulis surgentibus augetur. Circiter octavum à primo insultu diem intervalla pustularum priùs alba rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos claudunt. Proximæ à facie intumescunt  
 manus,



manus, digitiq; distenduntur; pustulæ faciei antea læves & rubræ, jam asperæ (primum maturationis indicium) & subalbidæ apparent, succum in super luteum, colore à favo non abludentem evomunt, faciei & manuum inflammatio jam summæ in pustularum interstitiis colorem exhibet floridum, & rosarum Damascenarum æmulum, quem quidem colorem, quo mitiores sunt variolæ, eo magis tum pustulæ tum cutis interjecta ad amissim exprimunt: Quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; quæ manus & reliquum corpus minùs asperæ albæq; magis conspiciuntur indies. Die undecimo faciei tumor & inflammatio recedunt, pustulæ maturæ & justam magnitudinem (viz. pisi grandiusculi) adeptæ exarescunt deciduntque. Decimo quarto vel quinto pereunt funditus; manuum autem pustulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt & tandem dirumpuntur, cæteræ autem, faciei nimirum & corporis desquamantur, & in facie squammulis hisce furfuraceis succedunt foveæ. Per totum morbi decursum alvus vel prorsus constipatur vel rarissimè dejicit. Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in discretis, undecimo autem in confluentibus intereunt: Quippe cùm in discreto hoc genere promovetur sudores tum cardiacis tum regimine

C. 4.

cali-

calidiore, prædicto die facies, quæ turgida & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat, è contra flaccida reperitur & albescens, pustulis nihilo minus rubentibus & elevatis, etiam post ægri mortem; sudor, qui huc usq; manaverat, derepentè evanescit, æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine, vehementibus, urinam parcè reddit ac frequenter, & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomiturius, &c. immaniùs sæviunt; licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit. Tertio die aut citiùs, rarò tardiùs, erumpunt; & quo citiùs, eo magis confluunt. Quandoq; ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod symptoma, v. g. acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non perinde, ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem pustularum ægrum discruciant: Nunc erysipclatis ritu, nunc morbillorum erumpunt, eruptio-

nis licet tempore planè distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem implicitæ, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturius elevant quàm discretæ: postmodum ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatæ cutis superficiem non admodum superant. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur, colore fusco: Intensus magis est dolor cutis, donec tandem in truculentiori morbo non nisi post diem vicesimum latioribus laminis desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quòd quanto pustulæ maturescentes propiùs ad colorem subfuscum vergunt, eò deteriores lentiùs abscedunt; quo magis autem flavescent, eò minus confluerint, & ocyùs se proripiunt. Ubi primùm deciderit pellicula, nullâ scabritie vultus afficitur; at verò mox illam excipiunt squammulæ fursuraceæ, indolis perquam corrosivæ, quæ foveas relinquunt patentiores, & sæpe cicatrices. Quandoq; humeri & dorsum cuticulâ denudantur. Morbi periculum à pustularum frequentia & numero in facie solâ, æstimandum. Pustulæ manuum & pedum majores, & quò altiùs ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultis salivatio. in infantibus diarrhœa (licet non ita certò) confluentium comes. Ptyalismus



nunc cum eruptione se prodit, nunc biduo triduoque præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viscidiorē ægerrimè, excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit, & potus per nares reuertitur. Tunc cessat ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti debeat, non tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere) & manuum jam insigniter incipiens & diutius perdurans suppetias tulerint, ægro protinus moriendum est. Diarrhœa non ita maturè infantes occupat, ac ptyalisinus adultos. In utraq; variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, quâ peractâ, desinit. Superveniunt à malo regimine symptomata anomala; qualia sunt, pustularum flacciditas & subsidencia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigræ exiguæ in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur: Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne perficitur.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasione ad  $\text{zix}$ , vel  $\text{x}$ , & postea *Vomitorium* exhibeatur ad  $\text{zj}$ , vel  $\text{zjss}$ , *Infusionis Croci Metallorum*.

His primis diebus diluatur sanguis frequenti potatione *Cerevisiæ tenuis Lupulatæ*.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum est sexto die post invasionem) vesperi propinetur *Syr. de Mecon.*  $\text{zj}$ , quæ repetatur dehinc singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Eâ nocte, si Variolæ de *Confluentium* genere fuerint, augeatur dosi ad  $\text{zjss}$ , quæ dein repetatur ad  $\text{zj}$ , mane, & ad  $\text{zjss}$ , serò, singulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si *Syr. de Mecon.* minus congruat, substitui possit *Laudan. Liquid.* viz. gutt.  $\text{xviijs}$ , pro  $\text{zj}$ , *Syrupi*  $\text{O}$  gutt.  $\text{xxv}$ , pro  $\text{zjss}$ . Hoc interim observandum, quod si paregoricum bis in die exhibitum orgasmum compescere non valeat (quod in Variolis insigniter confluentibus sub finem earum sæpe accidit) tum 3<sup>a</sup> quâque horâ exhibendum, vel sæpius, si opus fuerit.

At si Variolæ *Interstinctæ* fuerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus post plenam eruptionem exhibeatur *Paregoricum*, atq; etiam in minori dosi.

Qualiscunq; autem generis variolæ fuerint, atq; etiam qualiscunq; morbi tempore, si *Phrenitis* acciderit, omnino oportet ad inordinatum spirituum motum frænum injicere.

ac proinde si prior Paregorici dosi metam non attingat, alia atq; alia assumatur, donec tumultus penitus compescatur, interposito inter singulas doses spatio aliquo ; ut per-  
noscere valeamus, utrùm dosi ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger è lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeò viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum Syringa sæpe in fauces injiciatur. Componatur è *Cerevisia tenui* vel *aq. hord. cum Melle Rosarum* ; vel sequens usurpari poterit.

*Rx Cort. Ulmi ʒvj, rad. Glycyrrhiz. ʒß, Passular. enucleat. N° xx, ros. rub. p. ij, coq. s. q. aq. ad ʒijß, in Colatur. dissolv. oxymel. simp. & mell. Rosar. an. ʒij, M. f. Gargarisma.*

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, febris secundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus symptomatis, usq; adeò efferatur, ut Paregoricis utcunq; repetitis sufflaminari nequeat, & mors quasi immineat, tum sanguis ad satis magnam quantitatem illicò detrahatur, nempe ad ʒxij, vel circiter, atq; porro repeti possit semel vel bis in sequentib. diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postulârit ; at non aliàs.



aliás. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum inequnte (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitiv. 3j, dissolut. in aq. Cichor. vel. lactis Alexeter. 3iiij.* Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minùs Paregorica in usum veniant, quæ, (haud obstantibus iis) tam quoad largam dosin quàm repetitam exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, inungatur facies Linimento ex æqualib. partib. ol. Amygd. dulc. & Pomar. per biduum; at non ultra.

Die *xxj* post invasionem mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porrò alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usq; ad *xvij*, non aliis stragulis rectus, quàm quibus sanus uti solebat.

Jusculis Avenac. hordeac. Pomis coct. & Cerevisiâ tenui victitet, & post undecimum diem vini Hispanic. Coch. *iiij* vel *v*, bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor non evacuationibus præscript. cedat, tum foru fol. Malv. verbasco. Sambuc. Lauri, cum floribus Camæmel. & Melilot. in lacte coct. facillè fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat sanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præscribuntur, sextâ quâq; horâ (donec symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

#### *De chorea Sancti Viti.*

Convulsionis species quædam est, pueros puellâsve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim rectâ lineâ ori admovet, sed deductâ à spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem fortè fortunâ labris propius apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit;

haurit ; deditâ tanquam operâ, ut spectantibus risum moveret.

Sanguis ad *℥viij*, plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, portionis commun. hauriatur ; & vesperi haustulus sequens propinetur.

℞ *Aq. Cerasor. nigr. ℥j, aq. Epilept. Langii ℥iij, Theriac. Andromach. ℥j, Laudan. Liquid. gutt. viij ; f. haustus.*

Potio Cathartica. ad tres vices, alternis diebus, repetatur ; & haustus Paregoricus iisdem noctibus.

Postea Sanguis iterum extrahatur ; & ad Catharsin, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem ; spatio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus a purgatione vacuis sequentia præscribantur.

℞ *Conserv. Absinth. Roman. ℥ flaved. Aurantior. an. ℥j, Conserv. Anthos ℥ß, Theriac. Andromach. vet. ℥ nuc. moschat. condit. an. ℥iij, Zinzib. condit. ℥j, Syr. è succ. citr. q. s. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibend, vini sequentis Cochlear. v.*

℞



℞ Rad. *Pæonia*, *Enul. Campan.* *Imperator.*  
 & *Angelic.* an. ʒj, fol. *Rut.* *Salv.* *Betonic.*  
*Chamædr.* *Marrub. alb.* & *summitat. Centaur.*  
*min.* an. Mj, *Baccar.* *Juniper.* ʒvj, *Cortic.*  
*duor. Aurantior.* Incidantur & infundantur  
 frigide in vini *Canarini* ℥vj. Coletur tan-  
 tummodo usûs tempore.

℞ *Aq. Rut.* ʒiiij, *aq. Epilept.* *Lang.* & *Bryon.*  
*comp.* an. ʒj, *Syr. Pæon.* ʒvj; *M. f. Fulap.*  
*cap. Cochl.* iiij singulis noctibus cubitum itur-  
 us, instillando *Sp. C. C. gutt.* viij.

Applicetur plantis pedum Emplast. à Ca-  
 ranna.

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena,  
 & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni se-  
 quentis tempestate (vel paulo ante) quâ  
 morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quòd hæc me-  
 thodus curationi Epilepsiæ Adultorum con-  
 venire possit, quod tamen non adhuc ex-  
 pertus sum. Cum verò *Chorea Viti* ætates  
 teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adulto-  
 rum tam sanguinis detrahendi quantitas,  
 quàm Catharticorum dosis adaugeantur.

#### *De apoplexia:*

Somnusest profundissimus, & omnimoda  
 sensûs & motûs privatio, exceptâ respiratio-  
 ne,

ne, quam ægri habent difficilem cum ster-  
tore.

Mittatur Sanguis è brachio ad ℥xij quam-  
primum, ac postea ex venis jugularibus ad  
℥viii, deinde *Vomitorium* ex ℥j℥, vel ℥ij, *In-  
fus. Croc. Metal.* propinetur statim.

*Emplastr. Epispastic.* satis amplum ac for-  
te cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger  
in lecto, nec stragulis nimis obrutus.

*Sp. Sal. Ammoniac.* optimè rectificatus ad-  
moveatur naribus.

Finitâ Vomitorii Operatione, subinde ex-  
hibeantur *Coch. iij* vel *iiij* sequentis *Jula-  
pii.*

℞ *Aq. Rutæ* ℥iiij, *aq. Bryon. compos.* ℥  
*Antiepilept. Lanz. an.* ℥j, *Sp. C. C. gutt.* xx.  
*Sacchar. Crystal. q. s. f. Fulap.*

Vel *Cochleare j Sp. Lavendulæ compos.* per  
se propinari possit bis vel ter, durante pa-  
roxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpo-  
sitâ

Cavendum est, ne *Cardiaca* plus justo ca-  
lida, ac nimis frequenter (utî mos est) ex-  
hibeantur; nam quacunq; demum specificâ  
virtute pollere videantur, plus damni quàm  
emolumenti ægro apportant, utpote quæ hu-  
mores fundere (ac proinde malum augere)  
apta nata sunt: quod etiam incommodum  
non

non minùs infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur.

℞ *Pil. Coch. maj.* ʒij ; cap. tertiâ quâq; die per 6 vices horâ 4<sup>a</sup> matutinâ, superdormiendo.

℞ *Conserv. flor. salo. Rorismarin. an* ʒj, *Conserv. flaved. Aurant.* ʒvj, *nuc. moschat. condit.* ʒ Zinzib. *condit. an.* ʒʒ, *Theriac. Androm. vet.* ʒij, *pulv. elect. diamb. diamosch. dulc. an.* ʒj ; cum s. q. *Syr. conditur. citr. f. opiata*, capiat ad magnitudinem Castaneæ manè & serò, superbibend. aq. *Epilept. Lang. Coch. ij.*

℞ *Ambr. gris.* ʒʒ, *ol. destil. sem. Anisi, cinnamom nuc. moschat. an. gutt.* ij, *ol. Caryophyl. gutt.* j. *Sacchar. in aq. flor. aurantior. solut.* ʒiiij. f. s. a. *Tabellæ*, quarum capiat unam ad libitum.

Abusû potus generosioris cujusvis sibi temperet, vescatur jusculis avenaceis, hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quandoq; etiam (præcipuè inter purgandum) carne pullorum agnorum ac id genus ciborum eupepton.



*De opthalmia.*

Ex oculorum inflammatione pater.

Mittatur Sanguis è brachio ad 3x. Sequenti die sumat potionem purgativam communem, quæ repetenda est per duas alias vi-ces, duobus diebus interpositis; iisdem noctibus sumat *haustum paregoricum ex Syr. de Mecon.* 3j.

Diebus à purgatione vacuis sumat ter aut quater in die 3iiij *Emulsionis ex sem. frigid. maj. & Papav. alb.*

Rx *Aq. Plantag. Ros. rubr. & Spermat. Ranar. an. 3j pulv. Tutie preparat. 3j; f. Collyrium*, cujus guttæ aliquot instillantur oculis bis in die; at non incipiendum, nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur Venæsectio semel vel bis, (præcipuè si sanguis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquoris generosi, ab usu etiam ciborum coctu difficile, & sale conditorum; & diebus inter purgationes bibat hydrogalam coctam.

Nota, quòd sæpè accidit, quòd Venæsectioni & Catharsi utcunq; repetitis Ophthalmia non cedit; hoc in casu *Paregoric. ex Syr.*  
de

*de Mecon.* ℥j singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum supperiis absolvit.

### De Uteri Procidentia.

℞ *Cort. Querc.* ℥ij ; - *coq. in aq. font.* ℔iiij ad ℔ij, *sub finem addendo Cortic. Granator. contus.* ℥j, *ros. rubr. flor. Granator. an Mij,* dein *adde vini rubr.* ℔ss ; Colatura sit pro fotu, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur manè horis duabus, antequam è lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec symptoma penitus evanuerit.

### De paroxysmo nephritico.

Adsunt dolor fixus in lumborum regione, urina cruenta, arenularum aut calculi excretio, stupor cruris è directo renis laborantis, testis retractio ejus lateris, in quo est dolor, nausea & vomitus. Dolor colicus nephritico haud absimilis ; licet in quibusdam symptomatis planè discrepet, quæ recensita in *Capite de colica biliosa* videas.

Si Æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis è brachio affecto reni respondentem ad 3x ; dein *liquoris possatici* cui *Rad. Althææ* ℥ij. *incoctæ fuerint* Cong. j ; quam citissimè deglutiatur ; & Enema sequens injiciatur.

℞ Rad. *Althææ* & *Lilior.* an ʒj, fol. *Malv.*  
*Parietar.* *Branc.* *Ursin.* & flor. *Chamamel.* an.  
*M. j.* *Sem.* *Lini* & *fænu*græc. an. ʒß; coq. s.q.  
 aq. ad ʒjß; *M. f.* *Enema.* Rejēctis Vom-  
 itorio & Enemate, *Laudan.* *Liquid.* satis  
 magna dosi propinetur, viz. ad gutt. xxv;  
 vel *Pil. Matth.* gr. xv, vel xvj: In senibus  
 verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetu-  
 lis Vaporibus obnoxiiis (præcipuè si sub ini-  
 tium Paroxyismi urinam ex reddant nigram  
 & sabulosam) Venæsectio omittatur; at quo-  
 ad reliqua, eadem quæ dicta est viâ omni-  
 no procedendum.

*De dysenteria, diarrhœa & tenesmo.*

Rigent horrētque, sequitur deinde totius  
 corporis calor, quem brevi excipiunt ventris  
 tormina, & hæc dejectiones crebræ, & mu-  
 colæ omnes (nisi quodd stercorosæ nonnun-  
 quam interponantur) cum ingenti cruciatu  
 & molestissimo viscerum omnium quasi des-  
 censu, quoties exoneratur alvus, sanguinis  
 interim lineamentis intertextæ, licet aliquan-  
 do ne minimum sanguinis per totum morbi  
 decursum admisceatur. Progressu morbi  
 sanguis sincerus quandoq; excernitur, & gan-  
 grænâ insanabili afficiuntur intestina. Si  
 æger ætate floreat, vel cardiacis incalescat.  
 febricitat admodum, lingua est subalbida,  
 quadam



quadam mucilagine densè obsita, interdum nigra & sicca. Prosteruntur vires, dissipantur spiritus, aphthæ insuper oris interna faucésq; obsident, præsertim ubi materiæ peccantis evacuatio adstringentibus præpoterè impeditur, non exacto per cathartica morbi fomite. Aliquando, exulante febre, agmen ducunt tormina, & cætera morbi symptomata sequuntur.

In diarrhœa humores excrementitii sine sanguine aut intestinorum exulceratione excernuntur.

In tenesmo assidua est desidendi cupiditas, nihil tamen præter mucosum quoddam & suberuentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis è brachio quamprimum, eademq; nocte *Paregoricum* propinetur; & mane sequenti *potio purgans communis*, repetenda alternis diebus ad duas alias vices, & *Paregoric.* post Purgationes, quamprimum suo defunctæ sunt munere; ac diebus à purgatione vacuis idem manè & serò est exhibendum.

Post Vencæsectionem & Catharsin semel celebratam, per torum morbi decursum, sequens *Cardiacum* exhibeatur.

R. *Aq. Ceras. nigr. ℥ fragor. an. ℥iij, Aq. Epidem. Scord. comp. ℥ Cinnam. bordeat. an. ℥j, Margarit. præparat. ℥jß, Sacchar. crystal. q. s. adde aq. Rosar. Damascen. ℥ß, ad gratum saporem,,*

porem, M. f. *Fulap.* de quo cap. cochl. *iiij* vel  
v in languoribus, vel ad libitum.

Potus sit Lac coctum cum aq. triplo, vel  
Decoctum alb. ut,

℞ C.C.C. ℥ *micæ panis albiss.* an. *zij*, coqu.  
in. aq. font. *℥iiij* ad *℥ij*, postea s. q. *sacchar.*  
*albiss.* edulcoretur. Vel si dejectio virium  
pottulaverit, Aq. font. *℥ij* cum vin. *Canar-*  
*rin.* *℥ss* simul coctæ pro potu frigide assuman-  
tur.

Cum per tres vices purgatus fuerit æger,  
tota curatio usui *Laudani* bis vel ter in die  
repetiti postea incumbit, nisi quod *enema ex*  
*lact. vaccin.* *℥ss*, ℥ *Theriac.* *Androm.* *ziss* sub-  
inde injiciatur, quod in alvi egestionibus  
mirè confert.

Cum alvi fluxus in *Diarrhœam* tantum  
assurgat, *Phlebotom.* & *Catharsi* præscript.  
omissis, sequ. Bolus singulis matutinis exhi-  
beatur.

℞ *Rhabarb. pulv.* ℥ss (*plus minus pro rati-*  
*one virium*) cum s. q. *Diascordii* f. Bolus, ad-  
dendo ol. *Chym. Cinnamom.* gutt. *ij*.

Noctibus insequentibus *Paregoric.* ex aq.  
*Cinnamom.* hordeat *zj*, ℥ *Laudan.* Liquid.  
gutt. *xiiij* exhibeatur.

Ubi tormina sicca sine dejectionibus ex-  
cruciant, curantur diluendo sero lactis frigide  
propinato, & tepide injecto; ut in *Cholera*  
*morbo pullorum* jusculo aut lacte cerevisi-  
ato.

Si

Si hic morbus diutius excurrat, adeò ut omnis ejus vis in rectum intestinum decumbat, cum assidua desidendi cupiditate, Diæta Analeptica instituatur, & liquor aliquis Cardiacus pro libitu ingeratur, ut restaurari possint vires, quibus redeuntibus, Tenesmus sponte se proripit.

In dysenteria malè curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot discruciant, in hoc casu Phlebotomia repetita pristinam sanitatem restituet.

Notandum est, quòd in constitutionibus huic morbo minùs faventib. omissis evacuationibus dysenteria Laudano solo sanatur, quod manè & serò repetendum, donec symptomata penitus evanuerint, vel etiam ter Nycthemeri spatio, si opus fuerit.

#### *De colica biliosa.*

Intestinorum dolor atrocissimus est, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injectâ fasciâ constringit, aut in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur, neq; tam crebra vomituritio, neq; alvus ita pertinaciter catharticorum vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatiùs in puncto figitur, vomituritio frequentior, &  
major



major alvi adstrictio, colicâ tandem in iliâ-  
cam transeunte. A nephritide sic distingui-  
tur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est,  
& ab eo ad testem exporrigitur secundum  
longitudinem ureteris. Colicus verò vagus  
est, & cinguli instar medium ventrem affli-  
git. 2. A pastu colicus dolor augetur: Ne-  
phriticus potius imminuitur. 3. In colico  
dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum  
majus levamen emergit, quàm in ne-  
phritico. 4. In dolore nephritico urina pri-  
mum clara & tenuis, postea aliquid subsidet,  
& tandem arenulæ aut lapilli excernuntur:  
In colica urinæ ab initio crassiores exsiliunt.

Sanguis è brachio paulò liberaliùs educa-  
tur, & post horas *iiij* vel *iiij* *Anodyn.* exhibe-  
atur, Postero die *Cathartica Lenitiva.* & in-  
terposito die uno, ad tertiam vicem propi-  
netur.

At si malum hoc fructibus horariis, vel  
aliis cibis avidè ingestis, originem debeat,  
tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato  
assatim haulto eluendus est; quo exantlatò,  
*Anodynum* propinandum est; sequenti au-  
tem die vena secanda est, & in ordine præ-  
scripto procedendum.

Ubi hic morbus minùs peritè tractatus di-  
utissimè fatigaverit, & ægrum penè confecerit,  
liberalior sive aquæ *Epidem.* sive *Mirab.*  
sive aliùs cujuscunque, qua sanus maximè  
D dele-

delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem jovit.

*De cholera morbo.*

Intra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus, nullo temporis discrimine insurgit, qui licet eodem curetur modo, alterius tamen est subfelli. Adfunt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis; pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in 24 horarum spatio interimunt.

Pullus temerius in tribus circiter aq. font. Congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel (defectu ejus) liquoris possetici capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successivè repetenda. *Hauftibus & Clysteribus Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymphææ, coramve* alicujus uncia subindè admisceri poterit.

Ex-

Exantlato hoc Eluvionis penso ( quod *iiij* vel *iiij* horas sibi vendicat ) Paregoricum curationi Coronidem imponit.

Si non accesserit medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus, & jam frigescant membrorum extrema, tum ad *Laudanum Liquidum* confugiendum est in paulò majori dosi, (viz. *Laudan. Liquid. gutt. xxv. in aq. Cinnomom. fort. 3j*) & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum; at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam cholerae morbi infantibus valdè familiaris, ac sæpenumero funesta, ex Dentitione vel Crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minimè fert, ut diluatur ventriculus largâ liquorum potatione, multo minùs ut Catharticis tumultus major in humoribus excitetur, sed Curationem *Laudano* solo aggredi oportet; quamobrem *gutt. ij, iij, vel iiij, vel plures*, pro ratione ætatis, Cochlear. *j*, cerevisiæ tenuis vel Aquæ cujusvis appropriatæ instillatæ exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit.

De  
D 2  
De



*De Colica Pictonum.*

Est species quædam Colicæ, quæ degenerare solet in Paralyfin, & motûs omnimodam manuum ac pedum depravationem; quam hoc nomine *Riverius* in capite de Paralyfi indigitat, & apud insulas *Caribum* notissima est; utpote, quæ magnam vim hominum infestat.

Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsam. Peruv.* frequenter ac in magna dosi exhibitum, nempe si ejus gutt. xx, xxx vel xxxx, *Sacchar. albiss. cochl. j.* instillentur, & bis vel ter in die dentur: At Paralyfis huic remedio haud cedit.

*De iliaca passione.*

Peristalticus intestinorum motus invertitur, propinata cathartica & injecta enemata in emetica statim transeunt, alvi fæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad  $\text{zix}$ , vel x. Post aliquot horas exhibeatur sequens Pulvis.

*R* Resin. Scammon. vel (defectu ejus) Resin. Jalap. gr. xij, Calomelan. Torquet.  $\text{ʒj}$ ; M. f. Pulvis; cap. è Cochl. j, lactis vaccini, superbibendo

bibendo ejusdem lactis Cochl *j*, vel alterum,  
vel si forma Pilularum magis arrideat ;

℞ *Pil. ex duob. ʒß, Calomel. Torquet. ʒj ;*  
*cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pil. iiij, sumend.*  
*è Cochl. j. Syr. Violarum.*

Finitâ operatione Cathartici, sumat sequentem haustum.

℞ *Aq. Cinnamon. fort. ʒj, Laudan. Liquid.*  
*gutt. xxv ; M. f. haustus, qui porrò repetendus est bis, ter, vel sæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus cessaverint ; atq;*  
*eriam, istis symptomatis cessantibus, nihilo minus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori dosi cubitum iturus.*

#### *De fluxu mensium immodico.*

Menstruorum fluxus, naturaliter constitutus, capacitatem testæ ovi anserini implet. Paret autem immodicus ex difficili tolerantia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescencia.

Mittatur sanguis è brachio ad ʒviij ; sequenti manè sumatur *potio purgativa communis*, reperaturq; alternis diebus ad duas alias vices ; & noctibus post purgationem *Paregoric. è Syrup. de Meconio* exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis sumat sequentia.

℞ Conseru. Rosar. sicc. ℥ij, Trochisc. de terra Lemnia ℥jss, Cort. Granator. Corall. rub. præparat. & boli Armenæ, an. ℥ij, lapid. hamatit. Sanguin. Dracon. an. ℥j, cum s. q. Syr. Cydonior. f. Elect. de quo sumat ad magnitudinem nucis moschat. maj. manè & horâ 5<sup>a</sup> pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. vj.

℞ Aq. Germin. Querc. & Plantag. an. ℥iij, Aq. Cinnamom. hordeat; & Syr. de Rosis siccis an ℥j, Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.

℞. Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur simul. & succus exprimatur, & postea clarificetur, de quo cap. Cochl. iiij vel v sæpiusculè ad libitum.

Post primam purgationem applicetur Emplast. seq. regioni Lumborum.

℞ Emplast. de Minio & ad Herniam an. part. æq. extendantur super alutam, f. Emplastrum regioni Lumborum admovendum.



*De colica hysterica.*

Est species quædam, seu potius insigne ac valde vitatum affectionis hystericae symptoma, cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum Cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primo, quò Saburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediât Paregorici efficaciam, satis magna quantitas liquoris *possetici* affatim ingurgitetur; atq; iterum per vomitionem rejiciatur, nempe *ejusdem liquoris Cong. jß, quo peracto Laudan. Liquid. gutt. xxv in aq. Cinnamom. fort. aq. Epidem. vel alijs vehiculi ʒj, propinentur.*

In usu Paregoric. hoc notandum, quòd eò usque repetendum est, donec symptomata omnia penitus cessaverint. debitum interea tempus interjiciendo; ut dijudicare valeamus, quid prior dosis effecit, antequam novam ingeramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit æger, vel si antea hoc symptomate hand multum infestatus fuerit ac viribus fractus, hoc in casu sanguis primùm è brachio detrahendus antequam vomitorium præscriptum propinetur.

Hâc ipsâ Methodo Clavus hystericus curatur. Sin verò Colica HystERICA diuturnior fuerit per Paroxysmos affligens: tum in eorum intervallis, sive extra Paroxysmum, seq. usurpentur.

*R̄ Zedoar. subtiliss. pulv. ʒj ; cum s. q. Syr. è conditur. citri f. Bolus, sumendus mane & serò per xxx dies, superbibendo sequentem infusionem.*

*R̄ Zedoar. incis. minutim. ʒß, vini Canarin. ʒiiij, infundantur frigide per xij horas; deinde coquantur pro usu; vel, Balsam. Peruv. ut in Colica Pictonum, usurpetur.*

Quæ de Colica HystERICA hîc dicuntur, de Colica etiam hypocondriaca dicta sunt; ut & hoc diligenter advertendum.

Utriusq; affectus natura sibi vindicare videtur, ut alia atq; alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tamen si ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica HystERICA tam in hypocondriacis, quàm hystericis sæpissime in icterum desinit, qui sensim sponte suâ faceßit, sin autem longas moras neçtat, exhibeatur Apozema sequens.

℞ Rad. Rubiæ Tinctur. Curcum. an. ℥j, Cbelidon. maj. cum toto & summitat. Centaur. min. an. Mj; coq. in equalib. partibus vini Rhenani & aq. fontan. ad ℥ij, Colatur. dissolv. Syr. de 5 radicibus ℥ij; M. f. Apozema, de quo capiat ℥ss, calidè manè & serò, usque dum convaluerit.

*De ictero, colicâ neutiquam prægressâ.*

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta, corporis pruritus, segnities, & lassitudo, linguæ amaror, vomitus biliolus interdum, singultus, egestio alba, urina crocea & pannum immersum eodem colore inficiens, morbum indignant.

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur usum sequentium; & durante eorundem usu Catharticum præscriptum 4<sup>o</sup> quoq; die exhibeatur.

℞ Conserv. Absinth. Rom. Conserv. flaved. Aurant. an. ℥j, Angelic. condit. nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & Chalyb. cum aceto preparat. an. ℥ss, extract. Centaur. min. extract. Gentian. & Cremor. Tartar. an ℥ij, Croc. Angelic. pulv. ℥ss; cum s. q. Syr. de 5 radicibus f. Electuarium. de quo cap. ad magnitud.

D 5                      nuc.



nuc. moschat. manè & horâ 5<sup>a</sup> pomeridianâ (vel vice Electuarii sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosin *aquarum mineralium purgantium* ℥iij & post pomeridianam dosin *Apozemat. in Colica hysterica* descript. ℥ß.

At si signa hydropis affuerint, tam manè quàm serò apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obstiterit, ad *aquas ferreas* eundem est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

*Ad præcavendum abortum.*

Eadem præscribenda, ac in Fluxu mensuum immodico, omiſſis solummodò catharſi & succis.

*De immodico lochiorum fluxu.*

Fluxum lochiorum naturalem tria constituunt, sanguis scilicet purus, copiosus, per triduum primum fluens; dehinc sanguis aquosus, loturæ carniū crassiori similis, per quatrimum præter propter durans; hinc postmodum materia viscosa & mucilaginosa, paucò aut nullo sanguine permixta, per quinque aut septem dies prodiens, & sic porrò ad mensis finem.

**Fluxus**

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus est ex virium dejectione, animi deliquio, sanguine grumoso effluente, cibi fastidio, dolore in hypochondriis, ventris tensione, pulsu debili & frequenti, visus obtenebratione, aurium tinnitu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituitur, & potus sequens addatur.

℞ *Aq. Plantag. vin. rubr. an. ℥j* ; coq. *simul ad tertias*, & deinde educetur s. q. *sacchar. albiss. cujus*, cum frigescat, *cap. ℥ss* bis vel ter in die.

Interim Julap aliquod Hystericum (at satis mite) subinde propinetur, & nodulus sequens naribus applicetur ;

℞ *Galban. Ase foetid. an. ʒij, Castor. ʒjss, sal. succin. volatil. ʒss, M. f. nodulus*, vel

℞ *Sp. salis Ammoniac. ʒii* ; quem saepe olfaciat.

#### *De suppressione lochiorum.*

Intumescit venter, dolor gravativus in utero, ventrem, lumbos & inguina occupat, facies rubescit, difficilis est respiratio, perturbantur oculi, rigores, febres acutæ adsunt, animi deliquia, sudores frigidi, pulsationis & ardoris sensus in utero, paralytis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & *Emplast. Hystericum* umbilico admoveatur quamprimum, *Elect. seq.* adhibeatur;

*R. Conserv. Absinth. Rem. Rutæ an. ʒj, Trochisc. è Myrrh ʒij, Castor. Croc. Anglic. sal. volatil. sal. Ammoniac. & Asæ fœtid. an. ʒʒ; cum s. q. Syr. è 5 radicib. f. Elect. cap. ad magnitud. nuc. moschat. quartâ quâque horâ, superbibendo seq. Julap. Cochl. 4 vel 5.*

*R. Aq. Rutæ ʒiiij, Bryon. compos. ʒij, Sacchar. cand. q. s. f. Julap. vel sumat Trochisc. de Myrrh. ʒj 4<sup>a</sup> quâq; horâ.*

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & Lochia adhuc supprimantur, *Laudanum* unicâ saltem vice exhibendum ut, *Laudan. Liquid. gutt. xiiij in aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. gr. jʒ cum Asæ fœtid. ʒʒ, in pilulas duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum *Enema ex lacte Saccharato*, unicâ saltem vice, injiciatur.

#### *De hydropæ.*

Foveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ manere evanescentes hoc malum primum indicant, maximè si spiritus interim ægrius ducatur  
(haud



(haud rarò tamen foeminae praegnantès, & quibus catamenia fiſſuntur, ut & viri ab aſthmate inveterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribúſq; ad extremum extenſis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis ſuæ limen paulatim diſtendunt, donec tandem in vícera nobiliora imperu ab iis factò æger ſubmergitur. Pro rata qua partes à morbo obſeſſæ mole augmentur, aliæ magis magiſq; gracileſcunt, urgentibus dyſpnœâ, urinæ paucitate, & ſiti intensâ. Viros, ingraveſcente ætate; foeminas, ubi jam parere deſierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ ſunt primò ad aquarum evacuationem, deindè ad inſtaurandum ſanguinis robur; quò novus aquarum proventus præcaveri poſſit.

℞ Vini albi ℥iv, Jalap. ſubtiliſſ. pulv. ʒj, Zinzib. pulv. ʒß, Syr. de Spin. Cervin. ʒj, M. f. Potio, ſumenda ſummo manè, repetendâq; ſingulis vel alternis diebus, pro ratione virium, donec partes affectæ detumuerint; vel,

℞ Tamarind. ʒß, fol. Senn. ʒij, Rhei ʒjß, coq. in ſ. q. aq. ad ʒiij, in Colatur. diſſolv. Munnæ & Syr. Roſ. ſolut. an. ʒj, Syr. de Spin. cervin. ʒß, Elect. è ſucc. Roſar ʒiij, M. f. Potio, ſumenda, ut ſupra; vel,

℞

℞ *Pil. ex duob.* ʒj, *Elater. gr.* iij, *ol. Chym. Caryophill. gutt.* ij, *f. Pil. N° iij.* cap. summo manè, repetantúrque, ut opus fuerit ; vel,

℞ *Gambugii gr.* xv, *vin. alb. & aq. Cichor. an.* ʒjʒ, *Syr. de Spin. Cervin.* ʒʒ, *M. f. Potio,* sumenda ut supra ; vel,

℞ *Cortic. interior. Sambuc. è ligno derafi* *M. iij, coq. in aq. & lact. partibus aq. misto-*  
*rum tʒij, ad tʒij.* Colaturæ capiat dimidiam partem manè, & alteram serò quotidie, donec convalescat. At hoc remedium, nisi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.

Circa usum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda sunt.

Primò, utrùm ægri corpus facilè an verò difficulter Catharticis cedere soleat, cùm in iis qui facilè purgantur *Syrup. de Spin. Cervin. solus ad ʒj,* exhibitus aquas sat copiosè eliciat, in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica supra descripta, ut ut valida, vix scopum attingant.

Secundò, Cathartica omnia, quæ segniùs operantur, magis officiunt quàm proluunt ; quamobrem purgatio paulò fortior, & nimia, iusto debiliore est præferenda.

Tertiò,

Terriò, aquæ eâ maximâ celeritate exhauriri debent quam ægri vires ferre queant; ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aquæ denuò affatim colligantur.

Est autem ubi medicamenta omnia, qualiscunq; demum generis, quæ alvum movent, prorsus omitti possint ac debeant; quoties enim æger constitutione est infirmiori, vel fœmina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio Diureticis solùm committenda, inter quæ ea sunt efficacissima, quæ ex salibus Lixivialibus fiunt; ut,

℞ Cinerum Genistæ ℥j, infundantur frigide in vini Rhenan. ℔iv, liquoris per filtrationem colati ℥iij, manè, 5<sup>a</sup> pomeridianâ & serò singulis diebus exhibeantur, usq; dum humor evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis, Calefacientia & corroborantia medicamenta usurpanda; ut,

℞ Rad. Raphan. Rustican. fol. Cochl. bortenſ. absinth. vulgar. Salv. summitat. Centaur. min. & Genistæ, infundantur in Cerevisia forti pro potu ordinario, qui potus incipienti hydropi aliquando sine Catharticis subvenit, vel sequent. utatur;

℞ Conserv. Cochl. bortenſ. absinth. Roman. an. ℥j, extract. Gentian. absinth. vulgar. &  
Cen-



*Centaur. min. an. ℥iij, cum s. q. Syr. è cortib. citr. f. Electuarium, de quo sumat ad quantitatem nuc. moschat. maj. manè, 5<sup>a</sup> pomeridianâ, & vesperi, superbibend. ℥iv, sequentis infusionis.*

*℞ Rad. Gentian. ℥j, summitat. Genist. Centaur. min. & absinth. vulgar. an. M. j, Sem. fœnicul. & Petroselini an. ℥ij, incis. minutim affunde vini Rhenani ℥iv, stent simul in infusione frigida, & coletur solummodo tempore usûs.*

Notandum, cùm ad corroborantium usum deventum fuerit, ægrum nullo modo esse purgandum, tantisper dum sanguinis corroboracioni navetur opera.

Quod & per salium Lixivialium usum omnino observandum, quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

*℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥iij, fol. Coch. hortens. absinth. vulg. salvia, summitat. Centaur. & Genistæ, an. M. iij, Aurant. incis. N<sup>o</sup> iij. Infundantur in Congiis vj, cerevisiæ fortis non lupulatiæ, inter fermentandum; sit pro potu ordinario.*

*De Gonorrhœa virulenta.*

Corripiunt dolor genitalium insolitus, & rotatio testiculorum, in non recutitis macula morbilli æmula glandem occupat, statim à cujus exortu liquor, seminis initar, extillat, qui quotidie à seminis colore & consistencia recedens flavescit tandem dilutius ovi virello; in lue virulentiore virescit, & aqueo humori permiscetur sanguine tincto. Pustula dicta ulcus fit, aphthis infantum simile, indies latius & profundius depascens, superveniente orificii callo. Verpi non glandis ulcere, solâ Gonorrhœâ tentantur. Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur, quasi manu transversus fortiter constringeretur, noctu præcipuè urget, dum æger lecto incalescit. Curvatur penis à fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis, sed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maximè quâ in glandem desinit. Carunculæ lotii exitum quandoq; impediunt; & scroti dolor ac inflammatio nonnunquam superveniunt.

*R* Mass. Pil. Coch. maj. ʒiij, extract. Rudii ʒj, Resin. Jalap. & Diagryd. an. ʒß, cum s. q. opobalsam. f. Pilulæ è singulis drachmīs vj, cap. iv, singulis Auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis dnu-  
dum

dum imminuantur. Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit,

In iis, qui difficulter purgantur, subindè intercalari possit potio communis purgativa, cui addantur, *Syr. è Spin. Cervin. & Elect. è succ. Rosar. an. ʒij*, vel, curatione minùs scèliciter succedente *Turbith Minerale ad gr. viij*, exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis, vel vice *Turbith. mineral.*

*R̄ Pil. ex duob. ʒß, Merc. dulc. ʒj, cum f. q. opobalsam. f. Pil. iv*, summo mane sumendæ.

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, post pilulas primò descriptas, tribus Auroris continuis sumptas, tum manè & horâ 5<sup>a</sup> pomeridianâ quotidie injiciatur Clyster sequens, nisi quòd semel aut bis in hebdomade, omissso Clystere, Cathartic. imperandum.

*R̄ Elect. è succ. Rosar. ʒvj, Terebinth. Venet. vitello ovi solut. ʒß, dissolvantur in aq. bord. ʒj, Colaturæ adde Syrup. Violar. ʒij, M. f. Clyster.*

Singulis noctibus cap. *Opobalsam. vel Balsam. è Mecha gutt. xxv, sacchar. frustulo exceptas.* Hujus defectu *Terebinthina Cypria* ad quantitatem *Avellanæ* substitui possit.

Sit.



Sit pro potu hydrogala ; at Cerevisia tenuis in paltubus.

Vel sequentem methodum aggrediatur ;

℞ *Pil. ex duob.* ʒß, *Opobalsam. gutt. iij, f.*  
*Pil. N<sup>o</sup> iij.* Cap. horâ 4<sup>a</sup> matutinâ, superdormiendo, repetanturq; alternis diebus, vel tertiâ quâq; die.

Diebus à purgatione vacuis injiciatur manè & horâ 5<sup>a</sup> pomeridianâ Clyster supra descriptus.

Procedente curatione (quâcunq; ea demum methodo tentetur) sanguis sub medium curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incrassans præscribatur, & medicamenta iidem virtutibus pollentia, qualia sunt *hydrogala*, *Emulsiones ex seminib. frigid. &c.*

Si Penis Tumore afficiatur.

℞ *Rad. Althææ, Lilior. an.* ʒjß, *fol. Malv. Verbasc. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamæmel. Melilot. an. M. j, sem. Lini, Fænugrac. an.* ʒß, *coq. s. q. aq. font. & f. f.* totus parti affectæ admovendus per horæ unius spatium bis vel ter in die.

Peractâ fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. Lin. rec. extract. dein. *Emplast. è mucilag. inibus alutæ agninae inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si

Si Ulcus in præputii labiis, vel in subiecta Glande, hæreat, tum sequens Linimentum præscribatur.

℞ Unguent. Basilic. ʒvj, ungeunt. Nicotian. ʒij, præcipitat. aq. Rosar. loti & optimè levigat. ʒß, M. f. linimentum, quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post fotis præscripti usum.

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanguis è brachio extrahatur, atq; his in die fotus præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. fotibus addendo Sp. vin. Gallic. Cochl. j, vel alterum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum ejus loco applicandum.

Catharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

#### De lue Venerea.

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito astringentium usu labes sanguini imprimitur, exoritur lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artubus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos, crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescent. Quo magis scabies diffunditur, tanto minùs æger discrucietur. In cranio, tibiis brachiisq; exostoses, ossium inflammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus,

bus, sed fauces ut plurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata mox eam absumunt, ita ut fulcro destitutus nasus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbatis, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam Superis grave, humo condatur.

*Rx Axung. Porc. ʒij, Mercur. crud. ʒj, M.f. Linimentum.* in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibiae ad tres noctes continuas manib. suis æger perungat.

Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio hand procedat, tum *gr. viij, Turbith. mineral. in Conserv. Rosar. rubr.* exhibeantur; aut corporib. minus robustis, *Merc. dulc. ʒj*, aut si salivatio jam incepta priùs elanguescat, quàm symptomata penitus disparuerint, extimulanda subindè est eâdem dosi Mercur. dulc.

Ptyalismus ita moderari debet, ut *ʒiv*, Nycthemeri spatio expuat, aut circiter.

Si justo altiùs exurgat Ptyalismus, cum inflammatione nimia, atq; id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quam-



Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea; at sint ea, quæ prius usurpata fuerint.

Si Diarrhœa supervenerit (quod plerunq; accidit antequam salivatio benè assurgat) tunc sistenda est usu Laudan. Liquid, ita dosim augendo atq; reperendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, *Aq. Ros. Damascen. vel lacte aq. permisto, vel seq. decoct. idem coluatur.*

*R. Rad. Albææ, Hord. mundat. an. ʒj, sem. Cydonior. ʒss, coq. s. q. aq. ad ʒij, M.f. Gar-  
garisma, quo sæpius utatur.*

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in Catharsi imperanda, nisi quod primis aliquot diebus liquore possetico, jusculis avenac. hordeac. ac cerevisiâ tenui tepēfactâ nutriatur.

His omnibus ritè peractis (etiamsi symptomata omnia evanuerint, ac subinde morbus penitus profigari videatur) quo minùs recidivam postliminiò patiatur, ægro semel in septimana per 4 vel 6 vices, *Merc. dulc. ʒj*, exhibendus, atcunq; bene se habeat, & etiamsi jam domo egrediatur.

*De fluore albo.*

Quod effluit, modò album, modò pallidum, flavum, viride aut subnigrum, modò acre & erodens, retrum quandoq; & graveolens, decoloratur facies, dolet spina dorsi, prostermitur appetentiâ, oculi pedesq; intumescunt. Color colluviei linteolo exceptæ & rursus exiccata humorem ostendit.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥viij.

℞ *Pil. Coch. maj.* ℥ij, *Castor. gr.* ij, *Balsam. Peruv. gutt.* ij, *f. Pil. N° iv*, cap. horâ 4<sup>a</sup> matutinâ, superdormiendo; repetanturq; per duas alias vices interponendo diem unum vel alterum, pro ratione virium.

℞ *Aq. Rutæ* ℥iv, *Aq. Bryon. comp.* ℥ij, *Sacchar. Crystall. q. s. f. Fulapium*; *Cap. Coch. ij*, vel *iv*, in omni languore; deinde aggrediatur usum sequentium.

℞ *Theriac. Andromach.* ℥jss, *conserv. flaved. Aurant.* ℥j, *Diascord.* ℥ss, *Zinzib. condit.* ℥ nuc. *moschat. condit. an* ℥iij, *pulv. è Chel. cancr. comp.* ℥jss, *cort. exterior. granat. Rad. Angelic. Hispan. Corall. rubr. præparat.* ℥ Trochisc. *de terra Lemnia an.* ℥j, *Boli Armen.* ℥ij, *Gumm. Arabic.* ℥ss, *cum s. q. Syr. de Rosis siccis f. Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc. mos-*

moschat. maj. manè, horâ 5<sup>a</sup> pomeridianâ,  
& nocte per mensem integrum, superbiben-  
do sequent. infusionis Cochl. vj.

℞ Rad. Exul. campan. Imperator. Angelic.  
Calami Aromat. an. ℥ss, fol. Absinth. Roman.  
marrub. alb. centaur. min. Calamenth. vulgar.  
salvia sicca an. M. j, Bac. Funip. ℥j, inci-  
dantur minutim & infundantur in vini Ca-  
narini ℥iv, stent simul infusione frigidâ, co-  
letur tantummodò tempore usûs.

Vescatur cibus eupeptis, & abstineat ab  
usu olerum & fructuum qualiumcunq; &  
singul. partibus bibat vinum Hispanicum.

#### De Diabete.

Succi sanguini illati per vias urinarias  
crudi & inconcocti exitum sibi quærunt,  
unde sensim labefactantur vires, colliquescit  
corpus, & quasi substantia ejus per hanc cloa-  
cam exinanitur; cum siti, ardore viscerum,  
lumborum coxarûmq; intumescentiâ, & sa-  
livæ spumosæ expuitione crebrâ.

Eadem præscribenda sunt, quæ in fluore  
albo, omissis solummodò Venæsectione  
& Catharsi.



*De dolore hæmorrhoidum.*

Intensissimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conspergitur: Nonnunquam tumores verrucis similes in sphinctere delitescunt, vel in margine ani apparent.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad  
3x.

℞ Sem. Melon. Pepon. an. ʒss, sem. papav. alb. ʒij, Amygd. dulc. excorticat. N<sup>o</sup>v; contrundantur in mortario marmoreo, sensim affundend. Aq. Hord. ℥ijss, aq. Rosar. ʒij, Sacchar. albiss. q. s. f. s. a. emulsio; cap. ʒiij, sæpiuscule.

℞ Flor. Sulphuris, pulv. Glycyrrhiz. Salviae an. ʒj, cum s. q. Balsam. Lucatel. f. Pil. è sing. drachm. vj; cap. iij, ter in die, superbibend. Emuls. præscript. Cochl. vj.

E

℞ Aq.

*Rx Aq. Spermat. Ranar. ℥iij, in qua  
dissolv. Lithargyr. ℥ij, Opii ℥j; f. mix-  
tura; ejus tantillo Linteum madefac-  
tum parti affectæ applicetur, vel si ru-  
mor intus lateat, Coch. iij, ejusdem  
mixturæ modo Clysteris injiciantur.*

Pro potu ordinario bibat aquam cum  
lacte coctam, vel aquam hordei; & à  
carnis usu absterneat. Singulis noctibus  
sumat *Diacodium*.

*De fluxu hæmorrhoidum immodico.*

Innotescit ex viribus prostratis, copia  
& diuturnitate sanguinis excreti, sæpe cor-  
poris colore, ad citrinum ( ut in ictero )  
vergente. Succedit cachexia, & deinde  
hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu men-  
strui immodico, omisâ solummodò Ca-  
thart.

*De epilepsia puerorum.*

Vel primo mense aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus ( quo in casu *Diascordium ad quantitatem grani piperis in aq. Saxifrag. aut lacte materno solutum*, & exhibitum præstantissimum est remedium ). Vel circa dentitionis tempus, à septimo ad decimum mensem, rursi comitata est, aut ( quod multo deterius ) vomitu & diarrhœâ, viridia ( ut solent hysterica ) egerente infante. Quandoq; improvisè occupat paroxysmus, os oculòq; distorquens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens; quandoq; præsentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolita oculorum orbitarum immobilitate. Nunc ferius, nunc oculis se propriant paroxysmi certâ subinde periodo, vago alias insultu revertentes; sed, apperente morte, à tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in soporem proclives sunt infantes, donec à novo resuscitentur insultu.



Applicetur *Emplastr. Epispastic. cervi-*  
*ci quamprimum.*

℞ *Aq. Epilept. Lang. ℥iij, Laudan.*  
*Liquid. gutt. j, vel ij, vel plures, pro*  
*ratione ætatis, Syr. Pæon. ℥j; M. f.*  
*Hauftus, sumendus quam primum.*

℞ *Aq. Rutæ ℥iij, aq. Epilept. Lang.*  
*℥ aq. Bryon. comp. an. ℥j, Syr. Caryo-*  
*phyll. ℥β; M. f. Fulap. cap. Cochl. j,*  
*singulis horis, si haustus præscript. paro-*  
*xysmum non fugaverit.*

#### *De rachitide vera.*

In rachitide adfunt partium laxitas &  
mollities, debilitas & languor, ignavia  
& torpor, & inæqualis earundem nutri-  
tio, viz. caput justo majus, facies pleni-  
or & floridior, partes carnosæ infra caput  
emaciantur, nodis protuberant articuli,  
maximè carpi, paulo minùs tali, tument  
& extremitates costarum, ossa incurvan-  
tur,

rut, præcipuè tibiæ & fibulæ, hinc ulnæ & radii, aliquando femoris & humeri, decurvantur etiam ossa ; dentes tardè & molestè erumpunt, vacillant, nigrescunt, & frustulatim excidunt, pectus à lateribus angustum, anteriùs acuminatum, abdominis repletio, & hypochondriorum tensio, tussis & pulmonum vitia lacessunt, lateralis decubitùs modò dextri, modò sinistri aversatio.

℞ *Fol. Absinth. vulgar. Centaur. minor. Marrub. alb. Chamædryos, Scordii, Calamenth. vulg. Parthen. Saxifrag. pratens. hyper. virg. aureæ, serpill. menth. salv. rutæ. Card. Benedict. Puleg. Abrotan. Chamæmel. Tanacet. Lilior. convall. omnium rec. collect. & incis. an. Mj, axung. Porcin. ℥iiij, sev. ovin. & vin. Claret. an. ℥ij, macerentur in olla fictili super cineres calidos per horas xij, deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem, & postea colentur, ut f. Linimentum, quo venter & hypochondria illinantur manè & serò, ut etiam & artus hoc malo affecti, per 30 vel 40 dies, vel donec convalescant.*

*R. Singulor. ingredient. præscript. an.*  
*Mij*, infundantur frigide in Cerevisiæ  
 non Lupulat. Cong. *iiij*. pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occu-  
 pantibus ab Evacuationibus nimis proce-  
 dentibus.

Sanguis & Viscera herbis corroboran-  
 tibus confortentur, ut in Rachitide vera ;  
 nisi quodd axillæ etiam utræq; inungantur,  
 at non artus.

*De Febris à dentitione artis.*

*Sp. C. C. gutt. ij, vel iij, vel iiij, pro*  
*ratione ætatis in Cochl. j, vel altero aq.*  
*Cerasor. nigr. vel Julap. alterius appro-*  
*priati, exhibeantur 4<sup>a</sup> quâq; horâ ad vi-*  
*ces quatuor, vel sex.*

*De*



*De febre hectica infantum.*

Insigni quodam calore languent cum appetitûs dejectione, arius & truncus corporis emaciantur.

*Rhabarb. incisi* ʒij *in lagenam vitream cerevisiæ tenuis* ℥ij, *capacem* immittantur pro potu ordinario.

Epoto hoc liquore, *aliæ* ℥ij, *eidem Rhabarb. superaffundantur ad tertiam vicem.*

Si verò potus vi Catharticâ saturatiùs impregnetur, tum ℥ij, epotâ alteri cerevisiæ mox adjiciatur.

*De hæmorrhagia narium.*

Dolor & calor sinciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victûs ratio refrigerans & incrassans

LACERT

E 4

in-

injungatur ; Julap. refriger. & incras-  
sans, Cum Emulsionib. refrigerantib. præ-  
scribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refri-  
gerans*, atq; omni nocte *Paregoric. ex Sy-  
rup. de Mecon.* exhibeatur & semel vel  
bis *potio purgativa commun.* præscriba-  
tur.

*Lintea quadruplicata immersa aq. frigi-  
dæ, in qua sal Prunell. dissolvatur, & po-  
stea leviter expressa admoveantur nuchæ,  
& utrinq; cervici sæpius in die.*

Post Evacuationes liquor seq. applice-  
tur.

*R Vitriol. Hungaric. & Alum. an. ʒj,  
Phlegmat. Vitriol. ʒss, coq. tamdiu, donec  
omnia fuerint dissoluta, liquorem frigefa-  
ctum filtra, & à Crystallis subinde natu se-  
para, liquori residuo adde ol. vitrioli duo-  
decimam partem; vel potius.*

*R Aq. Plantag. ʒiij, bol. Armen. sub-  
tiliss. pulver. ʒß, probè misceantur; Tu-  
runda*

*turunda ex linteo raso liquore hoc humectata nari, ex quo sanguis stillat, indatur per dies duos isthic relinquenda.*

Hoc minus succedente, *Vitriol. Rom. Aq. commun. dissolvatur, quo Turunda imbuta nari indatur, liquore etiam hoc linteamina imbuta, & applicata, sanguinem sistunt, si ex parte externa diffuat.*

#### *De chlorosi.*

Ad sunt vultus & totius corporis decoloratio, intumescencia in facie, palpebris & malleolis, gravitas totius corporis, crurum ac pedum tensiva lassitudo, respiratio difficilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulsus febrilis, somnolentia, pica & mensium suppressio.

Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *pulv. Chalybeatum* in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbiben. haustum vini cujuslibet ad libitum, vel *infusion. corroborant. cum Rad. Angelic. ibidem descriptam.* Si *Ægra*



non valde debilis fuerit, purgetur semel  
vel bis ante præscriptorum usum.

*De suppressione mensium.*

Cibum fastidiunt mulierculæ, foedus  
faciei color est, gravitas totius corporis  
dolores sincipitis, lumborum, crurum &  
imi ventris; pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in Hysterica  
affectione; at si iisdem remediis affe-  
ctus non cesserit, tum seq. sunt præscri-  
benda.

Singulis Auroris, & 4<sup>a</sup> pomeridianâ,  
sumat *Zulap. Hysteric. sine Castor. Cochl.*  
*v. instilland. Sp. C. C. gutt. xij.* Singulis  
noctibus sumat cubitum itura *Trochisc. de*  
*Myrrh. ʒj, cum Syr. de Artemis. in formam*  
*boli vel Pil. redact.*

*De vomitu sanguinis, vel etiam de hæmoptoe.*

In hæmoptoe dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad ℥x, Sequenti mane sumat *portionem purgativ. commun.* & eadem nocte *Paregoric. ex ℥iij, aq. Cerasor. nigr. & Syr. de Mecon. ℥j.*

Postea aggrediatur usum sequent.

℞ *Bol. Armen. ℥j, Pulv. radic. Symphyt. ℥ij, Terr. Sigillat. Lapid. hæmatit. & Sang. dracon. an. ℥j, Sacchar. Albiss. ad pondus omnium; M f. Pulvis subtilissimus, cuius cap. ℥j, mane, 5<sup>a</sup> pomeridianâ, & nocte, superbibend. sequent. Apozemat. ℥iij.*

℞ *Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, & Millesfol. an. M. j; coq. s. q. aq. ad ℥jß, in Colatura dissolv. Syrup. de Symphyt. ℥ij; M.*

*M. f. Apozema*; vel cap. *Cochi. vj*, sequent, *Tincturæ*.

*Rx Flor. Ros. rubr. ʒvj, Cort. interna-*  
*querc. ʒß, sem. Plantag. parùm contus. ʒiij,*  
*Aq. font. ℥ij, Sp. vitriol. q. s. ad levem ac-*  
*ciditatem, infundantur in vase clauso, ca-*  
*lore leni, per 4 horas; Colatur. adde aq.*  
*cinnamom. hordeat. ʒiij, Sacchar. albiss.*  
*q. s. ut f. Tinctura gustui grata.*

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur *E-*  
*lectuario* in fluxu mensium immodico præ-  
*scripto.*

*Enema* quotidie injiciatur, & *Diacodi-*  
*um* horâ somni propinetur.

*Phlebotomia* insuper semel, bis, vel ter  
 ( ut opus fuerit ) reiteretur, diebus ali-  
 quot interpositis; & semel iterum, si res-  
 postulet, repetatur potio purgativa.

*Diæta* incrassans & refrigerans obser-  
 vanda.



*De punctura tendinis.*

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ jugiter destillat.

℞ Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad teneritud. coct. & contus. ℥iiij, farin. sem. Lin. & Avenac. an. ℥iij, coq. ad cataplasmati consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere, applicetur parti affectæ manè & serò.

*De ambustis.*

Foveatur pars affecta linteis Sp. vin. imbutis, usq; dum evanescat dolor, ac deinceps de novo imbuatur linteum, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur.

*De mania communi.*

A nimis exaltata & vivida sanguinis crasi oritur. Est & alia mania species febres intermittentes diurniores excipiens, in stultitiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vappiditate sanguinis, à diutina fermentatione. Præscribantur itaq; cadiaca generosiora, viz. *Theriac. Andromach. Electuar. de ovo, Pulv. Comitiss. Pulv. Gualt. Rawleigh, in aq. epidem. theriacal. vel aliâ*; & diæta instituaturs analeptica.

In junioribus mittatur sanguis è brachio ad *zviij* vel *ix*, bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæsectiones interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti *Cathartido*, quod sumat tertiâ vel 4<sup>a</sup> quâq; die, donec convaluerit, hoc interim observando, quod cùm octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

Rx *Pharmac. domestic. (i. e. rad. Bryon. alb.)* pulv. ʒj, lactis vaccin. ʒiiij; vel,

Rx *Ejusdem* ʒß vel ʒvj, vin. alb. ʒiiij, infundantur per noctem, in Colatura dissolve Syr. Violar. ʒj; M. f. Potio; vel,

Rx *Gambugii gr. xiiij, aq. Cerasor. nigr. ʒiiij, Syr. Caryophyll. ʒss; f. Potio.*

#### *De contusionibus.*

Mittatur sanguis è brachio lateris magis affecti ad ʒx; seq. mane exhibeatur potio communis purgativ. ac deinceps eodem modo Venæsectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convalescat. Interim toto decursu, si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur.

Rx *Decoct. Pectoral. ʒjss, Syr. Violar. cap. Ven. an. ʒij; f. Apozema; cap. ʒss ter in die. Item ol. Amygd. dulc. rec. Cochl. j, sæpius propinetur.*

Rx Ol.



℞ Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialthææ  
 & Pomat. an. ℥j; M. f. Linimentum,  
 quo inungatur pars læsa manè & serò,  
 superimponend. fol. Brassicæ.

*De furfure, sive porrigne capitis.*

*Potio purgans Communis bis propinetur,  
 dein.*

℞ Ol. Amygd. Amarar. & Laurini,  
 Cinerum fol. Abrotani an. ℥j, misceantur  
 probè, & f. Linimentum, quo inungatur  
 totum caput singulis matutinis, diligenter  
 infricando, & postea superimponendo ve-  
 sicam suillam.

At primùm abradatur totum capilliti-  
 um, & postea defricentur squammulæ  
 sensim singulis auroris, prout decidere  
 pronæ fuerint.

*De*

*De morfu canis rabidi.*

Post 40 dies aut plures melancholica  
adsunt symptomata, febris, sitis, hydro-  
phobia, & tandem partium extremarum  
convulsio.

℞ *Sp. vin. optimè rectificat. ℥iiij, The-  
riac. Andromach. ʒj ; f. mixtura, quâ  
illinatur pars læsa ter in die, superimpo-  
nendo linteum eâdem mixturâ imbutum.*

*De ulcere vesicæ.*

Pus graveolens, aut sanguis nonnun-  
quam squammulæ seu pelliculæ membra-  
nacæ ac veluti furfuracæ crustulæ ( sin  
in renibus hæreat ulcus, carunculæ mi-  
nutulæ, aliquando crassiores ) unâ cum  
urina excernuntur, perpetua dysuria  
& continuus earum partium dolor  
infestant ; renibus autem affectis ulce-  
re, dilucida dysuriæ & doloris dantur  
inter-

intervalla, pus etiam excretum copiosius est, album, leve & minimè foetidum. lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

*R. Emplast. Fior. unguent. dist. 3ij; f. Pul. N° ix; cap. iij horis medicinalibus, superbibendo sequentis Aq. Coch. vj.*

*R. Rad. Fœnicul. Consol. Ari. zizich. & Caryophyll. an. 3ij, fol. Agrimon. Hyper. Bugul. Sanioul. Plantag. an. M. vj, incidantur minutim, & destillentur in vini alb. & lact. an. ℥ iv, & eliciantur solummodo ℥ iv pro usu.*

*R. Pulv. rad. Consolid. maj. & gum. Arabic. an. 3j, Sacchar. Penid. 3ij; f. Pulv. cap. Coch. j, bis in die.*

*De asthmate inveterato in iis, qui sanguineo temperamento præditi sunt.*

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorq; est spiritûs tractio ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda: Asthma, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma,



diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis, violenter moventur, cum stertore & sibilo. In priore specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia oppilantur: Et Orthopnoeam, quæ est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotautes non nisi sedentes, & erectâ, cervice respirare possunt. Musculi etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 3x. Die sequenti sumat *portionem purgativam communem*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis sumat *sequentia*;

*R. Sem. Anis. subtiliss. pulv. ʒij, cum s. q. Balsam. Lucatell. f. Pil. ex singulis drachmis ʒj; cap. iij manè & quintâ pomeridianâ superbibend. decocti Amari sine purgantib. ʒiv calidè.*

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

#### *De paralyfi.*

Sensus & motus in partibus quæ afficiuntur, vel simul, vel alterutra tantum facultas aut prorsus extinguatur aut vitia-

Sumat

Sumat *Pil. Coch. min.*  $\mathfrak{z}\text{ij}$  alternis matutinis per  $\text{vj}$  vices; deinde capiat ter in die per  $\text{xxx}$  dies *Electuar. Antiscorbutic.*  $\mathfrak{z}\text{ij}$  superbibend. *Aqu. Antiscorbutic. Cochl.*  $\text{vj}$ . Vide in scorbuto.

$\mathfrak{R}$ . *Unguent. Nervin.*  $\mathfrak{z}\text{ij}$ , *Sp. Lavendul. comp.*  $\mathfrak{S}$  *Sp. Cochl. hortens. an.*  $\mathfrak{z}\text{ij}$ , quo inungantur partes affectæ, ut spina dorsi, &c. manè & serò.

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solùm destinari videantur; atamen cùm humores crudos ac fixos volatilifare præ aliis apta nata sunt, in Paralyfi etiam conveniunt.

#### *De tussi & phthisi.*

Tussis per se patet. Phthisis autem invadit ab ætatis anno 18 ad 35. Externuatur totum corpus. Febris molestat hæctica, à cibo invalescens (quæ ex celeritate pulsûs, rubedinéq; genarum dignoscitur) materia per tussim excreta cruenta est aut purulenta, in ignem conjecta tetrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, fundum petit. Sudores nocturni

nocturni superveniunt, livescunt tandem genæ, facies pallat, exacuuntur nares; temporum quoque collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequituram denuntiant.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa Peripneumoniam notham comitantia, accersiverit, vel si à Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, male curatis eadem nequaquam orta fuerit, fatis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis abstineat, & his similibus remediis ad libitum utatur.

*Balsamum sulphuris Anisatum ad gutt.*  
x, Cochl. j, Sacchar. Crystall. instillarum  
bis vel ter in die devoretur; ut etiam  
Tabellar. sequent. quas secum æger con-  
tinuò portet, unam frequenter assumat.

*Rx. Sacchar. Cand. ℥ij, coq. s. q. aq.*  
*font. usque dum adhærescat extremis di-*  
*gitor. tum adde pulv. Glycyrrhizæ, Enul.*  
*Campan. sem. Anis. & Angelic. an. ℥ss,*  
*pulv. Irid. Florentin. Sulphur. an. ʒij,*  
*Ol. Chym. Anisi ʒij; f. s. a. Tabellæ do-*  
*mestica vocand. atque hoc interim Ecleg-*  
*mate utatur.*

*Rx.*



*Rx. Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Syr. Cap. Ven. Violac. an. ℥j, Sacchar. Cand. q. s. f. Lobocho. de quo sæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ, quando tussis urget.*

*In defluxione tenui Eclegmata incrasantia exhiberi poterint.*

Sin verò Tussis his remediis haud cessaret (præcipuè autem si febrim comitem habeat, vel si à Peripneumonia aut Pleuritide originem ducat) tum ineptum fuerit pectoralibus fidere; sed Venæsectione & Catharsi debellanda est, ut in methodo, quæ in curatione Peripneumoniæ nothæ describitur.

Verùm enimvero cùm, his omnibus non obstantibus, Tussis non modò non curationi cesserit, sed & diurnâ Pulmonum concussionem eos adeò debilitaverit, ut Phthisis tandem subingressa fuerit, tum hæc methodo procedendum.

*Rx. Balsam. Peruv. gutt. x, instillantur Cochl. j, Syr. Hederae terrestriæ, vel si id minus gratum fuerit ægro, Cochl. j. Sacchar. Crystall. cap. ter in die superbibendo Decocti. Amari sine purgantib. ℥iv, vel (si idem ventrem moverit) ℥iij.*

Sed

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa sunt) *Equitatio* ad satis longa & diutina itinera facile palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quàm si puer aut juvenis esset, & sanè haud multò certius *Cortex Peruv.* febri intermittenti, quàm in hac ætate *Equitatio* Phthisi medetur.

### *De scorbuto.*

Adsunt spontaneæ lassitudines, corporis gravitas, dyspnœa, præcipuè ex motu corporis, gingivarum putrefactio, oris graveolentia, sanguinis è naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, crurum nunc intumescencia nunc extenuatio, in iisdem perpetuò maculæ lividæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ, faciei color plerumque ex pallido fuscus.

Extrahatur sanguis è brachio ad ℥viij, nisi signa Hydropis adfuerint. Seq. mane exhibeatur *Potio Purgat. communis*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus

Diebus à purgatione vacuis, uti etiam postea, per mensem unum vel alterum fumat sequentia.

*R.* *Conserv. Cochl. hortens. ℥ij, Conserv. Lujul. ℥j, pulv. Ari compos. ʒvj, cum s. q. Syr. Aurantior. f. Electuar. de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. maj manè, quintâ pomeridianâ, & nocte, superbibendo Aq. Raphan. compos. Cochl. vj, vel sequentis.*

*R.* *Rad. Raphan. Rustican. raspat. ℥ij, rad. Ari ℥j, fol. Cochl. hort. M. xij, fol. Menth. Salv. Nasturt. aquat. & Beccabung. an. M. vj, sem. Cochl. hort. parum contus. ℥ß, nuc. Moschat. ʒß, Vin. Alb. ℥xij, destillentur organîs communib. & eliciantur solummodo ℥vj, pro usu.*

*Vel Folia rec. Cochl. hortens. per se destillentur pro usu dicto.*

*Porro sequens Cerevisia sit pro potu ordinario.*

*R.*



*R. Rad. Raphan. Rustican. recentis incisi ℥ij, fol. Cochl. hortens. N° xij, passular. enucleat. N° vj, Aurant. cum toto incisi dimidium, in Lagenam vitream ℥ij, Cerevisiæ tenuis capacem subere mox probe obturandam immittantur.*

In hunc modum parentur eodem tempore sex Lagenæ pro usu, & post aliquot dies sex aliæ, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps; vel,

Vice hujus Cerevisiæ seq. mixturæ Cochl. iij vel iv immisceri poterint singulis haustibus potûs communis.

*R. Rad. Raphan. Rustican. & sem. Cochl. hortens. an. ℥ß, fol. Cochl. hortens. M. ij, pulpam unius Aurant. Contundantur simul in mortar. marm. sensim affundendo vin. alb. ℥ß, Coletur cum levi expressione, & reponatur pro usu.*

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsi omniis, in Rheumatismo scorbutico, sive Hysterico, valde prosunt.

F I N I S.

F

*Libri Medici, Anatomici, Chirurgici,  
& Plantarum Historia, qui pro-  
stant Venales apud Sam. Smith &  
Benj. Walford, Londini. 1694.*

*In Folio.*

**J**oanni Raii S.R.S. Historia plantarum  
generalis species haecenus editas, a-  
liasq; insuper multas noviter inventas,  
& descriptas complectens, accesserunt  
Lexicon, & nomenclator Botanicus  
cum Indicibus Neccessariis 2 vol.

Willughbei Ornithologia, sive historia A-  
vium cum Iconibus elegantissimis ex  
recensione Joannis Raii S.R.S.

---Ejusdem historiae Piscium libri IV.  
cum figuris elegantissimis totum Opus  
recognovit Jo. Raius S.R.S.

Hippocratis & Galeni Opera Gr. Lat. con-  
junctim edita per Chartarium 13. tom.  
*Paris.*

---Opera Gr. Lat. cum Annotat. Foesii.  
*Genevæ. 1615.*

Bidloo Anatomia humani Corporis cum  
105 fig. illust. 1685.

Diemerbroeck Opera omnia Anatom. &  
Med. *Ultrajecti. 1685.*

Biblio-

- Bibliotheca Anatomica 2 vol. cum figuris.  
*Genevæ.* 1685.
- Boneti (Theo.) Sepulchretum sive Anatomia  
pract. 2 vol. *Gen.* 1679.
- Thesaurus medico-practicus 3 vol. *Gen.*  
1692.
- Medicina Septentrionalis 2 vol. cum figu-  
ris. *Ibid.* 1685.
- Mercurius compitalitius sive index med:  
pract. *Ibid.* 1683.
- Dioscoridis Opera Gr. Lat. ex interpr. J.  
Saraceni. *Gen.*
- Lacunæ Epitome Operum Galeni. *Lugduni*  
1643.
- Theoph. Paracelsi Opera Omnia 2 vol.  
1658.
- Riverii Opera omnia Medica. *Gen.* 1679.
- Zacuti Lusitani Opera 2 vol *Lugduni.* 1647.
- Fabr. Hildani Opera Med-Chyrurg. cum Se-  
verino. 1682.
- Sennerti Opera omnia 5 tom. in 3 vol. *Ludg.*  
1666.
- Aquapendente Opera Anatom. & Phys. cum  
fig. 1687.
- Malphigii Opera omnia. *Londini.* 1686.
- Schenkii observationes Med. rariores. 1665.
- Pharmacopæia Collegii Reg. *Londini.*
- Augustana Aucta & renovata.
- Bruxellensis:
- Zwelferi Animad. in Pharmacop. August  
2 vol.



Pifonis & Margravii Hist. Indiae cum fig.  
1658.

Jonstoni Hist. Animalium 2 vol. cum figuris.

Charleton de differentiis Animalium. 1677,

Matthiolus in Dioscoridem de Plantis cum fig.  
1674.

Breynii Plantarum Exoticarum Centuria  
cum fig.

Horti Indici Malabarrici tom. xi. cum fig.  
1692.

Bauhini Historia Plantarum 3 vol. cum fig.

Morisoni plantarum historia universalis cum  
fig.

Hernandez historia plantarum, Animalium, &  
Mineralium Mexicanorum cum fig.

Spigelii Anatomia Corporis humani cum fi-  
guris.

Mentzelii Index Plantarum cum fig.

Rivini ordo Plantarum cum figuris. 1691.

Chabraei Stirpium Sciagraphia & Icones.  
1678.

Ettmulleri Opera omnia 2 vol. 1688.

Horstii Opera omnia Medica.

Forresti Opera omnia 2 vol.

Fernelii Universa Medicina 1680.

Lipenii Bibliotheca Medica. 1679.

Plucknetii Phytographia 2 vol. cum 800 fig.  
1692.

Boranicum, Anglicum, or the *English* Her-  
bal, being a Collection of Plants, Trees,  
Shrubs and Herbs, with their uses in Phy-  
sick. Sylvii

Sylvii (de la Boe) Opera omnia 1681.  
Zeidlern Anatomia humani Corporis. 1686.

*Libri Medici Quarto.*

**A**cta Eruditorum Lipsiæ ab An. 1682.  
ad An. 1693.

The Philosophical Transactions, published  
by the Royal Society, in 8 vol. which are  
continued from Jan. 1693. and published  
Monthly.

Miscellanea curiosa medico-physica Anni xx.  
1692.

Sylvii Opera Medica. *Amst.* 1680.

Diemerbroeck Anatomia.

Tho. Willisii Opera omnia. *Amst.* 1682.

--De Anima Brutorum oxon.

Harderi Apiarium Observat. Med. 1687.

Munnick Chirurgia. 1689.

Dolæi Encyclopædia-Chirurgica. 1689.

--Encyclopædia Medica.

Waltheri Sylva Medica opulentissima.

Spindleri Observat. Med. 1691.

Blegny Zodiacus Medico Gallicus Anni 5.  
1680.

Pœchlini Observationes phys. med. cum fig.  
1691.

Ang. Salæ Opera Medico-Chymica. 1682.

Swammerdam de Insectis, cum figuris.

Castelli Lexicon Med. per J. Brunonem.  
1682.

Ruyschii Observat. Anat. Chyrgurg. cum fig.  
1691.

Craanen. praxis medica.

---De Homine cum fig.

Zwelferi Pharmacopeia Augustana.

Pauli Quadripartitum Botanicum.

Bartholini Acta Medica 5 vol. cum fig.

Borelius de motu Animalium cum fig.

Quercitani Pharmacopœia rediviva. 1679.

Wepferi Cicuta aquatica. 1679.

Castro de morbis mulierum.

Burneti Thesaurus Med. pract.

Joelis Opera Med.

Verney de Organo Auditus cum fig.

Charras Pharmacopœia Galen. Chym.

Bauhini pinax Theatri Botan. cum prodromo.

Cleger Specimina Medicinæ Sinicæ. 1682.

Helvighii Observat. Phys. Med.

Coberi Observationes Med.

Broeckhuysen Rationes Phys. Med.

Cardilucis officina Sanitatis.

Hofferi Hercules Medicus.

Mauriceau de morbis mulierum pregnant.

Vander Linden de scriptis Medicis. 1686.

Bellinus de Urinis & Pulsibus, Febribus, &c.

1685.

Langii Opera Medica. 1688.

Jo. Michaelis Opera Medico-Chyrgurg. 1688.

Peyerus de Ruminantibus cum fig.



*Libri Medici 8° & 12°*

- A** Manni praxis Vulnerum Lethal. 1690.  
 Abercromby de Luc Venerea & Pulsibus.  
 Bartholini Anatomia cum fig.  
 Briggs Ophthalmographia & de Visione.  
 Blancardi Lexicon Med. Edit. Secunda. 1690.  
 ---Anatomia reformată cum fig. 1688.  
 ---Praxeos Medicæ Idea nova 1615.  
 ---Anatomia Practica, 12°  
 Bohn de Renunciatione Vulnerum. 1689.  
 Blasii Medicina Curatoria. 1680.  
 ---Anatomia hominis.  
 Bausnerus de consensu partium.  
 Borelli Observat. Med.  
 Batanicum Monspeliense.  
 Becheri physica subterranea.  
 Barneri Chymica Philosophica. 1689.  
 Bruelli praxis Med.  
 Burnetti Thesaurus Med. 2 vol. 12°  
 Bayle opuscula Med. 12°  
 Collectanea Chym. *Leidensia*. 1693.  
 Chesneau Observat. Med.  
 Car. Epistolæ Medicinales. 1691.  
 Charleton de Causis Catumenici.  
 ---De Scorbuto.  
 ---Oeconomia Animalis 12°  
 Celsus de Medicina 12° 1686.  
 Dickenson de quintessentia Philos. 1689.  
 Donker de febribus Petechialibus. 1686.  
 Eugalenus

Eugalenus de Scorbuto.

Franchimont Lethotomia Med.

DeGraaf Opera omnia. 1678.

Goedartius de Insectis 8°

Grim. compend. Med. Chym. 1684.

Goeckelii concilia Medica 8°

Goodschalke de Ossium Generat. 1691.

Glisson. opuscula Med. 3 vol. 12°

Hippocratis Opera Gr. Lat. 2 vol. per Vander Linden.

Hoffman de Acidi & Viscidi, &c, 1689.

Harmanni praxis Chymiatrica 8°

Hermanni Hortus. *Lugd. Bat.* 1690.

Harvæus de Motu Cordis 12°

---De Generatione Animal. 12°

Helmont Fundamenta Medicinæ 12°

Jones de febribus intermittentibus.

Jonsoni Lexicon Chymicum.

Juncken praxis Med. 1689.

Lyseri Culter Anatomicus.

Love Morley de Morbo Epidem.

Lamzwerde de Molis Uteri.

Le Mort Pharmacia & Chymica.

Lister de Fontibus.

---In Goedartium de Insectis.

Lower de Corde & motu Sanguinis.

Lossii Concilia Medica.

Minficht Armament Med. Chym. 1675.

Meekren Observat. Med. Chyrurg.

Mayerne de Arthridite.

Merret pinax Britan.

Need-

Needham de formato fœtu.

Nuck Sialographia, & Adenographia. 1682.

---Operationes Chirurgicæ. 1683.

Plot de Origine fontium.

Pechlinus de purgantibus cum fig.

Pharmacopœia Leoverdientis 12° 1692.

-----Persica.

Walschmidt praxis Med. 1691.

---Institutiones Med. 1692.

Sculteri Armament Chyrurg. cum Apendice.

Schellancer de Auditu cum fig.

Scretas de febribus malignis.

Stalpartii Observat. Med, Chyr. 2 vol.

Tulpîi observat. Med. Chyrurg.

Theatrum Chymicum 6 vol.

Vieussens Neurographia cum fig.

Verzaschæ Observat. Medicinæ.

Le Mort Idea actionis Corporum. 1693.

Joannis Raii S.R.S. Synopsis Methodica Animalium Quadrupedum & Serpentine Gen-  
neris: vulgarium notas Characteristicas,  
Rariorum descriptiones integras exhibens:  
Cum Historiis & Observationibus Anato-  
micis perquam curiosis. Præmittuntur  
nonnulla de Animalium in Genere, Sensu,  
Generatione, Divisione, &c. Lond. 1693.  
Octavo.

---Ejusdem Synopsis Methodica Stirpium  
Britannicarum. 1691. Octavo.

Richardi Morton, M.D. Regii Collegii Me-  
dicor Lond. Socii, & Censoris, ΠΥΡΕ-

ΤΟΛΟΓΙΑ



ΤΟΛΟΓΙΑ seu exercitationes de morbis universalibus âcutis. *Lond. 1692. Oct.*

---Ejusdem Phthiologia seu exercitationes de Phthisi tribus libris comprehensæ, totumque opus variis historiis illustratum. *Lond. 1689. Oct.*

Gulielmi Cole, M. D. Novæ Hypotheseos ad explicanda febrium intermittentium Symptomata & typos excogitatæ Hypotyposis. Una cum Ætiologiâ remedium; speciatim verò de Curatione per Corticem peruvianum. Accessit Dissertatricula de intestinorum Motu peristaltico. *Lond. 1693. Oct.*

Gualteri Harris, M. D. Collegii Medicorum *Lond.* Socii atque Censoris tractatus de morbis acutis Infantum. *Lond. 1689. Octavo.*

Theodori de Mayerne Equit. Aurati Mag. Brit. Reg. Archiatror, comitis, Praxeos in morbis Internis præcipuè gravioribus & Chronicis Syntagma, ex adversariis, Conciliis ac Epistolis ejus summâ Cura ac diligentia concinnatum. *Lond. 1690. Oct.*

Pharmacopœia Bateana, Quâ Nongenta circiter Pharmaca è praxi Geo. Batei Regi Carolo Secundo Medici primarii excerpto ordine alphabetico concisè exhibentur. Editio altera priori multò locupletior: cum viribus ac Dosibus annexis. Item Arcana Goddardiana ex Autographo Autoris

toris Desumpta. Curâ Ja. Shipton. Lond.  
1691. Duod.

**Pharmacologia** seu Manuductio ad Materiam Medicam in qua Medicamenta Officinalia, Simplicia, in Methodum Naturalem digesta succincte, & accurate describuntur, cum notis generum Characteristicis Specierum synonymis, differentiis, & Viribus, Opus Omnibus Medicis, Philosophis, Pharmacopeis, Chirurgis & Pharmacopolis utilissimum à Sam. Dale. 1693.

**Osteologia Nova**; Or *some New Observations of the Bones, and the Parts belonging to them, with the manner of their Accretion and Nutrition*; communicated to the Royal Society by Clopton Havers M. D. in Oct.

**A Collection of Curious Travels and Voyages, in two Tomes.** The first containing Dr. Leonard Rauwolff's Itinerary into the Eastern Countreys. The second taking in many parts of Greece, Asia Minor, Egypt, Arabia Felix, and Petraea, Ethiopia, &c. From the Observations of Mr. Belon, Mr. Vernon, Dr. Spon, Dr. Smith, Dr. Huntingdon, Mr. Greaves, Alpinus, Vesslingius, Thevenot's Collections, and others, to which are added three Catalogues of such Trees, Shrubs, and Herbs as grow in the Levant. By John Ray, Fellow of the Royal Society. Lond. 1693. Octavo.

*The Wisdom of God manifested in the Works*  
of



of the Creation. viz. The Heavenly Bodies, Elements, &c. Fossils, Vegetables, Animals, &c. In the admirable structure of the Body of Man, &c. By John Ray, Fellow of the Royal Society. The Second Edition much enlarged. Lond. 1692.

--His Discourses concerning the Changes and Dissolution of the World, viz. Of the Creation and Chaos, of the General Deluge, &c. Earthquakes, Conflagrations, &c. The Second Edition, Corrected, and very much enlarged, and illustrated with Copper Plates. Lond. 1692. Oct.

*Medicinal Experiments; or a Collection of choice and safe Remedies for the most part Simple and easily prepared; useful in Families, and very serviceable to Countrey People.* By the Honourable R. Boyle, Esq; Fellow of the Royal Society. To which is annexed a Catalogue of his Theological and Philosophical Books and Tracts. Lond. 1693. Price 1 s.

--A Second Volume, containing about three hundred new Receipts, published from the Author's Original Manuscripts, and by him recommended to the Care of his Executors, and perused by some of his Learned Friends, together with a large Preface written by the Author's own hand. Lond. 1693. Price 1 s. 6 d.

With most of the other Tracts of Mr. Boyle in 4° and 8° Latine and English.



by Bodies,  
Animals,  
the Body  
low of the  
ion much  
anger and  
the Creat-  
ure, &c.  
The Se-  
much en-  
er Places.

action of  
most part  
in Fa-  
very Per-  
ple, Es-  
ed is ar-  
and Phi-  
d: 1693.

not de-  
from the  
ed by him  
reasures,  
Friends,  
en by the  
3. Price

Dr. Boyle

